

*С. Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ Ұлттық Медициналық
Университеті*



*Казахский Национальный
медицинский университет
им. С. Д. Асфендиярова*

Кафедра: Психиатрия, психотерапия және наркология

Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1)

Қабылдаған: м.ғ.д проф. Садуақасова Қ.З

Орындаған: Мейрамбек А

Факультет: Жалпы медицина

Тобы: 035-2к

Алматы, 2016 ж.

Посттравматическое стрессовое
расстройство-психическое
расстройство которое появляется после
травмирующих событий. (Катастрофа,
гибель семьи,потеря жилья,насилие и .
тд.)

КАКИЕ ТРАВМИРУЮЩИЕ СОБЫТИЯ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ПТСР?

К травмирующим событиям, которые чаще всего приводят к развитию посттравматического стрессового расстройства, относятся следующие:

- Война
- Террористические акты (напр. взятие в заложники)
- Природные катастрофы
- Автомобильные аварии/авиационные катастрофы
- Физическое насилие
- Изнасилование
- Тяжелые медицинские процедуры (хирургические операции и т.д.) / (характерно для детей)

Причины, вызывающие ПТСР, не ограничиваются вышеуказанным списком. К посттравматическому стрессовому расстройству может привести любое событие, представляющее реальную (или потенциальную) угрозу жизни и здоровью, и которое первоначально вызвало состояние сильного эмоционального потрясения и/или физического шока.

- гибель семьи
- потеря жилья и имущества
- насилие
- похищение человека


Основные группы симптомов

**Повторные проживание
психотравмирующего события**

**Избегание вещей, которые напоминают о
психотравмирующем событии**

**Увеличенное беспокойство, тревога и
эмоциональные возбуждение**

Симптомы ПТСР — Повторное проживание психотравмирующего события

- Навязчивые воспоминания
 - Перепроигрывание
 - Интенсивные физиологические реакции
 - Расстройства сна
 - аутизм
- 

Симптомы ПТСР — избегание напоминаний о психотравмирующем событии

- Избегание действий, мест, вещей, мыслей и / или ощущений, которые напоминают о психотравмирующем событии;
- Депрессия, чувства одиночества, вина, стыд
- Потеря интереса к жизни, апатия;
- ангедония
- Ощущение ограниченности в будущем (вы не думаете, что проживете нормальную жизнь, создадите семью, сделаете карьеру и прочее).

Симптомы ПТСР — увеличенное беспокойство, тревога и эмоциональное возбуждение

- Раздражительность и / или вспышки гнева;
- Трудности с концентрацией / сосредоточением внимания;
- Гипербдительность / гиперконтроль;
- Ощущение нервозности и быстрой возбудимости.

ПТСР:

критерии диагностики (1)

- А. Наличие ситуации катастрофического характера;**
- Б. Повторные переживания;**
- В. Избегание;**
- Г. Гиперактивность;**
- Д. Продолжительность расстройства более 1 месяца;**
- Е. Нарушение адаптации.**


ПТСР:

критерии диагностики (2)

А. Наличие ситуации катастрофического характера:

- Больной был свидетелем или участником событий, представляющих реальную угрозу смерти, физического вреда или ущерба ему самому или другим;
- Реакция на ситуацию в виде страха, беспомощности или ужаса.

ПТСР: характер травмирующих ситуаций (в мирное время)



Breslau, 1999

□ Қолданылған әдебиеттер

М.П Коркина ,М.Д Лакосина, “Психиатрия”М., 2000.

Р.Г.Илешева“Психиатрия”

Н.Н.Иванец,

Ю.Г. Тюльпин,В.В.Чирко,М.А.Кинкулькина “Психиатрия
и наркология”

Н.М. Жариков , Л.Г.Урсова,Д.Ф.Хритинин,К.Т.Сарсембаев
«Психиатрия» 2010.

www.google.kz

