

# **ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В НОРМАЛЬНОМ ДЫХАНИИ.**

Подготовила преподаватель ПМ 04,05  
Азарцова А.М.

Наиболее частыми признаками, свидетельствующими о недостаточном обеспечении организма человека кислородом, являются одышка, кашель, кровохарканье, боль в грудной клетке, тахикардия.



# ОДЫШКА

*субъективное ощущение затруднения дыхания.*

*Пациент говорит, что ему «не хватает воздуха», «нечем дышать».*



*Известно два вида одышки с периодическим дыханием.*

- **Дыхание Биота** характеризуется ритмичными, глубокими дыхательными движениями, которые чередуются примерно через равные отрезки времени с продолжительными (от нескольких секунд до полминуты) дыхательными паузами.



□ **Дыхание Чайна- Стокса** после продолжительной дыхательной паузы (апноэ) сначала появляется бесшумное дыхание поверхностное дыхание, которое быстро нарастает по глубине, становится шумным и достигает максимума на 5-7 - ом дыхании, а затем в той же последовательности убывает и заканчивается следующей очередной кратковременной паузой.



# **КАШЕЛЬ**

**Это защитно-рефлекторный акт,  
направленный на выведение из  
бронхов и верхних дыхательных путей  
мокроты и инородных тел. Кашлевой  
толчок- это форсированный звучный  
выдох.**




# КРОВОХАРКАНЬЕ

выведение крови или мокроты с кровью во время кашля



**Боли в грудной клетке**  
возникают обычно при  
вовлечении в патологический  
процесс листков плевры.



# КУРЕНИЕ



**одна из первых причин  
возникновения проблем с  
дыханием, особенно, в течение  
продолжительного времени и  
большого количества сигарет,  
ведет к развитию хронических  
обструктивных заболеваний легких  
и раку легких.**



## **ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА ПРИ НАРУШЕНИИ ДЫХАНИЯ.**

На основании данных, полученных при оценке состояния пациента, т.е. его возможности удовлетворить потребность в нормальном дыхании, формируются те или иные проблемы пациента.



## ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С:

- -незнанием, неумением, нежеланием или невозможностью занять положение, уменьшающее одышку или боль;
- -нежеланием выполнять дыхательные упражнения регулярно;
- -неумением пользоваться плевательницей;
- -неумением использовать ингалятор;
- снижением физической активности (из-за одышки или боли);
- -страхом смерти от удушья;
- -необходимостью отказа от курения;
- -снижением аппетита из-за мокроты с неприятным запахом;
- -непониманием необходимости регулярного приема назначенных врачом лекарственных средств.



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО УХОДА


Обсуждая совместно с пациентом план предстоящего ухода в связи с неудовлетворением потребности в нормальном дыхании, следует предусмотреть достижение одной или нескольких целей:



- пациент будет знать и сможет занять положение, облегчающее дыхание;
- у пациента сохранится физическая активность, необходимая для самоухода;
- -пациент сможет самостоятельно пользоваться ингалятором (плевательницей);



Рис. 12-1. Применение карманного ингалятора.



- пациент принимает лек. средства в соответствии с назначением врача;
- -пациент уменьшит количество выкуриваемых в день сигарет;
- -пациент (родственники) знает приемы самопомощи при приступе удушья;
- -пациент знает меры, уменьшающие дискомфорт, связанный с откашливанием мокроты.



# СЕСТРИНСКИЙ УХОД

- **Положение** пациента в постели с приподнятым изголовьем кровати
- **Постуральный дренаж** (дренирующее положение)
- Обучение пациента « **технике кашля**»
- По назначению врача сестра проводит **оксигенотерапию** (кислородная терапия).



# ОЦЕНКА СЕСТРИНСКОГО УХОДА.

В процессе реализации плана ухода сестра осуществляет текущую и итоговую оценку эффективности сестринского вмешательства.

