

Препараты для лечения атеросклероза.

План:

- 1. Классификация препаратов для лечения атеросклероза.
- 2. Статины.
- 3. Фибраты.
- 4. Секвесторы желчных кислот.
- 5. Никотиновая кислота и ее производные.

- Атеросклероз - хроническое заболевание, характеризующееся:
- уплотнением и потерей эластичности стенок артерий,
- сужением их просвета с последующим нарушением кровоснабжения органов;
- обычно поражается (хотя и неравномерно) вся артериальная система организма.

Причины:

- Наследственная предрасположенность
- стрессы,
- малоподвижный образ жизни
- курение
- ожирение
- гипертония
- сахарный диабет
- неправильное питание

1. Классификация:

- Статины.
- Фибраты.
- Секвесторы желчных кислот.
- Никотиновая кислота и ее производные.

2. Статины

- торможение синтеза холестерина в клетках организма и снижение концентрации холестерина в крови
- стабилизируют атеросклеротическую бляшку и предотвращают возникновение осложнений связанных с ее разрушением

- снижают риск возникновения инфаркта (и инсульта) у больных, получающих статины,
- уменьшается число внезапных смертей,
- реже наступает нестабильная стенокардия (предынфарктное состояние).

Побочные действия:

- головные боли, головокружения,
- диарея, запор,
- тошнота, вздутие живота,
- также возможны судороги, зуд кожи, нарушения сна.
- Частота возникновения минимальна при соблюдении правильного режима дозировки.

Противопоказания:

- беременность и кормление грудью,
- острые заболевания печени,
- травмы, хирургические операции, инфекции,
- тяжелые эндокринные болезни,
- повышенная чувствительность к лекарству.

Ловастатин (Мевакор, Медостатин, Холетар, Кардиостатин)



- **Форма выпуска:** Таб. 0.1, 0.2, 0.4
- **по 1 табл. 1 раз (вечером)**



Симвастатин

(зокор, вазилип, симгал, симвор,
симвастол, овенкор)



- Форма выпуска: таб. 0.005, 0.01, 0.02, 0.04
- **(по 1 табл. 1 раз вечером, во время ужина)**



Проварастатин Липостат



- Форма выпуска: табл. 0,01 и 0,02
**(по 1 табл. 1 раз вечером, во
время ужина)**

Флувастатин Лескол



- Форма выпуска: табл. 0,01 и 0,02; капс. 0,02 и 0,04 (по 1 табл. 1 раз вечером, во время ужина)



Аторвастатин



Липримар, Липтонорм, Аторис,

Атомакс



- Форма выпуска: табл. 0,01 и 0,02; по 1 табл. 1 раз вечером во время ужина



3. Фибраты

- ускоряют работы ферментов расщепляющих жиры крови, что в свою очередь снижает концентрацию жиров (липопротеидов и холестерина) в крови.
- могут нарушать работу печени и усиливать образование камней в желчном пузыре.

Побочные действия:

- такие же как и у статинов,
- сексуальная дисфункция,
- в редких случаях - анемия.

Противопоказания:

- **беременность и кормление грудью,**
- **болезни печени и желчного пузыря,**
- **почечная недостаточность,**
- **гиперчувствительность,**
- **детский возраст до 18 лет.**

Фенофибрат

Липантил



- Форма вып.: капс 0.1; 0,145; 0,2
пол капс. 2 раза, после еды



Ципрофибрат

Липанор



- Форма выпуска: Капсулы по 0,1(по 1 капс. 1 раз во время еды)

4. Секвесторы желчных кислот

- **препятствуют всасыванию желчных кислот из 12-перстной кишки,**
- **что способствует снижению количества холестерина в крови,**
- **не дают возможности холестерину всасываться и из продуктов питания**

Побочные действия:


- запор, диарея
- обострение геморроя,
- тошноту,
- обострение язвенной болезни.
- нарушают всасывание других лекарств,
- другие АП принимать за 1 час или через 4 часа после приема секвестрантов желчных кислот.

Противопоказания:

- гиперчувствительность,
- период лактации и беременности,
- патологии желчевыводящих путей,
- повышение либидо,
- кровотечения (ж.к.т.).

Холестирамин (Colestyramine)

Колестирамин



- **Список:** общ
- **Форма выпуска:** пак. 500.0 (по 2,5 гр.
3 раза смешивать с фруктовым соком)

5. Никотиновая кислота и ее производные

- расширяют сосуды,
- способствует быстрому метаболизму жиров в организме, что приводит к снижению концентрации холестерина в крови.

Побочные эффекты:

- **приливы жара, покраснение лица и верхней части туловища,**
- **зуд кожи,**
- **повышение уровня глюкозы крови,**
- **обострение язвенной болезни и гастрита,**
- **нарушения сердечного ритмы,**
- **образование камней в ЖВП.**

Противопоказания:

- тяжелые формы гипертонии,
- язвенная болезнь,
- беременность и кормление грудью,
- повышенная чувствительность к препарату,
- подагра.

Кислота никотиновая

витамин РР

- Форма выпуска: табл. 0,05; амп. 1%-1 мл



Эндурацин

- Состав и форма выпуска:
- 1 таблетка ретард содержит никотиновой кислоты 500 мг;
- во флаконах по 100 шт.
- **Начальная доза — 500 мг 1 раз в сутки в течение первой недели ,**
- **по 1 табл. утром и вечером — во вторую неделю лечения. Начиная с третьей недели — по 500 мг 3 раза в сутки.**



Липостабил -

Фосфолипиды + Пиридоксин +
Никотиновая к-та + Аденозина
монофосфат

- Форма выпуска:
- ампулы 5мл и 10 мл № 5;
- капсулы форте № 50



Ситуационная задача № 1.

- К вам обратился мужчина с просьбой проконсультировать его. Врач поставил ему диагноз «Атеросклероз» и выписал препараты «**Никотиновая кислота**» таблетки 0,05 х 3 раза в день, «**Аторис**» 20 мг. по 1 таблетке 1 раз в сутки.
- Мужчина интересуется, достаточно ли будет принимать один препарат «**Никотиновая кислота**». Ваши действия.

Ституационная задача № 2.

- К вам обратилась женщина с рецептом на препарат «Зокор» 20 мг. Утверждает, что препарат выписал ей врач, но не сказал как его принимать. Ваши действия.
- Расскажите о побочных действиях этого препарата.

Домашнее задание:

- Работа с учебником стр. 718-733.
- Работа со справочной литературой, интернет ресурсами.
- Написание реферативных работ по теме «Водно-солевой обмен в организме».