

**учреждение высшего профессионального  
образования  
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Министерства здравоохранения Российской  
Федерации**

**(Ректор СибГМУ, д.м.н., профессор О.С. Кобякова)**



**Кафедра инфекционных болезней  
и эпидемиологии**




**Зав. кафедрой  
д.м.н., профессор  
Лепехин Алексей Васильевич**

# **ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ- ИНФЕКЦИИ. ПОСТКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА.**

Выполнила: студентка V курса  
IIIЗ группы ЛФ Монгуш  
Сайлык Ким-ооловна

Заражение ВИЧ возможно, если содержащая вирус биологическая жидкость проникает в органы в результате:

- случайной травмы иглой или хирургическим инструментом;
- попадания на поврежденную кожу или слизистые;
- незащищенного полового акта с ВИЧ-инфицированным партнером;
- использования общих игл и других приспособлений потребителями инъекционных наркотиков;
- переливания зараженной ВИЧ крови и ее препаратов.




## **ВОЗ выделяет 4 основных направления деятельности, направленной на борьбу с ВИЧ-инфекции и её последствиями:**

- 1. Предупреждение половой передачи ВИЧ, включающее такие элементы, как обучение безопасному половому поведению, распространение презервативов, лечение других ЗППП, обучение поведению, направленному на сознательное лечение этих болезней;**
- 2. Предупреждение передачи ВИЧ через кровь путем снабжения безопасными препаратами, приготовленными из крови.**
- 3. Предупреждение перинатальной передачи ВИЧ методами распространения информации о предупреждении передачи ВИЧ путем обеспечения медицинской помощи, включая консультирование женщин, инфицированных ВИЧ, и проведение химиопрофилактики;**
- 4. Организация медицинской помощи и социальной поддержки больным ВИЧ-инфекцией, их семьям и окружающим.**



# Экстренные меры после контакта с ВИЧ



# Рекомендуемые схемы антиретровирусной постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции

<i>НИОТ</i>		<i>ИП или ННИОТ</i>
Зидовудин + ламивудин		<ul style="list-style-type: none"> <li>Нелфинавир (Вирасепт<sup>®</sup>) (1250 мг 2 раза в сутки)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Комбивир<sup>®</sup> (300/150 мг 2 раза в сутки)</li> </ul>		Или
или		<ul style="list-style-type: none"> <li>Лопинавир/ритонавир (Калетра<sup>®</sup>) (400/100 мг 2 раза в сутки)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ретровир<sup>®</sup> (250 мг 2 раза в сутки)</li> </ul>	+	Или
<ul style="list-style-type: none"> <li>Эпивир<sup>®</sup> (150 мг 2 раза в сутки или 300 мг 1 раз в сутки)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Индинавир (Криксиван<sup>®</sup>) (800 мг 3 раза в сутки)</li> </ul>
		Или
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Эфавиренз (Сустива<sup>®</sup>) (600 мг 1 раз в сутки)</li> </ul>



**Спасибо за внимание!!!!**