#### Противовоспалительные

- Ангина, простудные заболевания, воспаление легких, почек, отит
- Раневая инфекция, СИЛЬНОЕ воспалении легких, ангина

 Воспаление почек, цистит

- АУГУМЕНТИН (875 мг.)

   1 т./2 раза в день или ампицилин 2т./4 раза в день
- <u>ЦЕФТРИАКСОН</u> 1 флакон (1 г) + 5 мл физраствора/2 раза в день в/м.
- <u>ЛОКСОФ</u> (500 мг) 1 т. в день

# Желудочно – кишечные расстройства

• Нифуроксазид

• Энтеросгель

• Линекс (Хилак)

• Иммодиум

- Кишечный антибиотик –
   2 т./3. в день.
- Сорбент 1 ст. л./3 раза в день.
- Восстанавливает микрофлору – 2 к./3 р. в день
- Оказывает
   ВРЕМЕННОЕ действие

#### Спасработы

- Подойти к пострадавшему, определить в сознании ли он.
- Не менять положение тела
- Выяснить тяжесть и характер повреждений, попросить пошевелить руками и ногами
- Ввести обезболивающее, даже если пострадавший без сознания во избежание шока. 1 ампула анальгина, 1 ампула кетолонга, 1 ампула дексаметазона

#### Спасработы

- Транспортировать до ближайшего комфортного места (ровная площадка)
- Срезать одежду
- Обработать раны
- Наложить гипс
- Транспортировка
- Продолжать вводить обезболивающие все время по схеме:





#### Черепно-мозговая травма

- Потеря сознания
- Рассеянность сознания в дальнейшем
- Судороги или двигательное возбуждение
- Выделение из ушей (носа) светлой или розовой жидкости
- Непроизвольная рвота

#### Черепно-мозговая травма

- Удалить волосы вокруг раны, края обработать
- Положить стерильную салфетку. При необходимости открытую рану накрыть продезинфицированной мыльницей, кружкой (каркасом)
- Наложить повязку
- Лед (снег в кульке, мокрые салфетки)
- ЛАЗИКС от отека, 1-3 т.
- ДЕКСАМЕТАЗОН 1 т./каждый час
- Транспортировать на боку или животе

### Ушиб внутренних органов

- Сначала присутствует боль, затем перестает болеть. Пострадавший становится вялым и не чувствует боли. и все стало хорошо и тепло + холодный ПОТ
- Лед или снег на область ушиба
- ДЕКСАМЕТАЗОН 1 амп./каждый час
- Срочная транспортировка!

## Дизенфекция ран

- Перекись водорода для очистки раны
- **Хлоргексидина биглюконат** (дезинфекция)
- Йоддицерин
- Фурацилин (для промывания «мокнущих» ран) – 2 таблетки/2 мл. горячей воды

#### Обезболивание

- **Кетанов** (Кеталонг) в таблетках 2 т./4 раза в сутки
- **Кетанов** в ампулах 1 амп./3 раза в день. 1 ампула=3 таблетки
- **Аналгин** в ампулах 1 амп./3 раза в день.
- **Дексаметазон** стимулирующее средство по 1 амп. Каждый час

#### Высотная болезнь

Гипоксия

Острая сердечная недостаточность

Проблемы с дыханием, отек легких

## Острая сердечная недостаточность

- Учащенный поверхностный пульс
- Быстрая утомляемость
- Бледность или синюшность лица
- Боли в сердце, нарушение сознания

- <u>НИТРОГЛИЦЕРИН</u>, <u>ВАЛИДОЛ</u> – по 1 т. симптоматично
- <u>ЦЕЛАНИД</u> 1-2 т. до 3 раз в день, желательно на ночь. Замедляет ритм сердца.

#### Легочная недостаточность отек легких

- Человек тяжело
- дышит, хрипит, задыхается,
- **СУЛЬФОКАМФОКАИН** в/м по 2 мл. (1 ампуле) 2-3 раза в день. Снимает напряжение с поверхностное дыхание дыхательной системы
  - ЛАЗИКС (табл. 40 мг) -Мочегонное, снимает отек легких и мозга. Разовая доза - 1-2 табл. в зависимости от тяжести состояния
  - **ДЕКСАМЕТАЗОН** 1 амп./каждый час

## Стимуляторы (высота)

- **КОРДИАМИН** (амп. 0,25 г.)— стимулятор сердечной деятельности только при <u>СЛАБОМ ПУЛЬСЕ! —</u> 1 амп. в/м. 3 раза в день
- **КОФЕИН** стимулирует дыхательный и сосудодигательный центры, усиливает работу сердечной мышцы. Мобилизирует ресурсы организма **1-2** ампулы под язык. Не больше **3** ампул в день
- **ПАНАНГИН** Витаминный препарат, помогающий работе сердца **под нагрузкой** 4-5 т./день

#### Обморожения

• Обморожение I степени — лечится согреванием обмороженного участка

- Поражённый участок кожи бледный, после согревания розовеет
- Первые признаки чувство жжения, покалывания, затем онемение
- Омертвения кожи не возникает

• Обморожение II степени

• Признаки обморожения І степени + образование пузырей, наполненных жидкостью

#### • Обморожение III степени

Пузыри, наполненные кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. Гибель всех элементов кожи с образованием рубцов

#### • Обморожение IV степени

• Повреждённый участок конечности резко синюшный, иногда с мраморной расцветкой. Отёк развивается сразу после согревания и быстро увеличивается. Поражение суставов

### Лечение и профилактика обморожений

- **ТРЕНТАЛ** профилактика + лечение. Улучшает переферийное кровоснабжение
- **ГЕПАРИН** (лечение) повышает текучесть крови
- **ДЕКСАМЕТАЗОН** стимулятор, при сильном обморожении

- Профилактика от 2 таблеток за раз
- Лечение по 2-4 таблекти в день

- 2 флакона хватит на 4 раза в/м
- 5 ампул на 1-1,5 дня