



Пульмонологиядағы шұғыл көмек


Ситуациялық есеп № 2


Жедел жәрдем бригадасын шақыру:

Науқас П., 27 жаста. Кенеттен пайда болған ауа жетпеу және өліминен қорқу сезімінің, тоқтаусыз ұстама тәрізді жөтел пайда болғанына шағымданады.




Оған қандай сұрақтар қояр едіңіз?


- 
- Ауа жетпеу сезіміне және тоқтаусыз жөтелге не себеп болды?
 - Мұндай жағдайдың пайда болу жиілігі қандай?



Мұндай жағдай бөлмені
дезинфицирлеуші ерітіндімен
өңдегеннен кейін 20-30 минут өткен
соң бірінші рет пайда болған.



**Анамнезінде неге көңіл
бөлесіз?**

- 
- ❖ Ауа жетпеу сезімі пайда болғаннан бері қанша уақыт өтті?
 - ❖ Тыныс алу жүйесінің қосымша ауруларымен ауырады ма?
 - ❖ Аллергиялық реакциялар?

АНАМНЕЗІ


- Ауа жетпеу сезімі 5-7 минут бұрын пайда болған.
- Тыныс алу жүйесінің қосымша аурулары болған емес.
- Аллергиялық реакциялары жоқ.



**Объективті қараған кезде
қандай мәлімет алуыңыз
мүмкін?**

Объективті статус

- Есі анық, жағдайы орташа ауырлық дәрежеде. Инспираторлы ендігу. Үрлемелі жөтел.
- Тері жабындысы бозғылт, айқын гипергидроз.
- Жүрек тондары тұйықталған, ЖСЖ 110 рет/мин, АҚ 130/80 мм рт.ст.
- Бауыры ұлғаймаған.
- Ісінулер жоқ..



Науқаста қандай
синдромдарды
байқадыңыз?

- Жедел тыныс жетіспеушілік синдромы:
- Инспираторлы ендігу, үрлемелі жөтел.
- Тері жабындысы бозғылт, айқын гипергидроз,
- Тахикардия.



Сіздің диагнозыңыз?




DS: Ларингоспазм




Госпитализацияға дейінгі
этапта жедел терапия?

- Науқасты ыңғайлы жартылай отырғызу.
(аяқтарын төмен түсіру)
- Жөтелге қарсы заттар: бутамират (панатус, синекод)
- Жылы бумен ингаляция, t° 28-32 С.
- Әлсіз іш айдайтын заттар: прометазин 1-2мг/кг.
- Дексаметазон 0,6мг/кг, б/е.
- Сальбутамол аэрозоль түрінде 1-2 дозадан, күніне 3-4 рет немесе небулайзер арқылы 1,25-2,5 мг



**Сіздің арықарайғы іс-
әрекетіңіз?**

- 
- Пульмонология немесе реанимация бөліміне госпитализациялау.
 - Отырғызып немесе бас жағын көтеріп тасымалдау.