

# Расстройства ЭМОЦИЙ

*Лекция для студентов*

*Доцент кафедры психотерапии с курсом ИДПО*

*к.м.н. Пермякова О.А.*

*2017г.*

# Эмоции

- 
- ```
graph TD; A[Эмоции] --> B[положительные  
отрицательные]; A --> C[эпикритические  
- корковые  
протопатические  
- подкорковые]; A --> D[стенические  
(мобилизующие)  
астенические  
(дезорганизующие,  
угнетающие)];
```
- положительные
  - отрицательные

- эпикритические
  - корковые
- протопатические
  - подкорковые

- стенические  
(мобилизующие)
- астенические  
(дезорганизующие,  
угнетающие)

# Основные функции эмоций

1. Сигнальная
2. Коммуникативная
3. Формирование поведения

# Эмоции оценивают по:

- высказываниям больного
- внешнему виду
- выражению лица, мимике
- жестам
- тембру голоса
- вегетативным реакциям

# По силе и длительности выделяют

- *Эмоциональные реакции*
- *Настроение*
- *Аффекты*

# Симптомы эмоциональных расстройств:

- гипертимия,
- гипотимия,
- эйфория,
- дисфория,
- тревога
- амбивалентность
- эксплозивность
- эмоциональная лабильность
- эмоциональная ригидность
- болезненная психическая нечувствительность (anesthesia psihica dolorosa)
- апатия
- эмоциональная монотонность (эмоциональная тупость )
- эмоциональное огрубение

# Аффект

- Физиологический

- Патологический

- сумеречное помрачение сознания
- аффективный разряд
- расслабленность вплоть до сна
- последующая амнезия
- признаются невменяемыми

**Эмоциональные  
(аффективные  
синдромы)**

```
graph TD; A[Эмоциональные (аффективные синдромы)] --> B[Депрессивный]; A --> C[Маниакальный];
```

**Депрессивный**

**Маниакальный**



# Депрессивный синдром

## Депрессивная триада

- Гипотимия
- Замедление мышления
- Двигательная заторможенность

Идеи самообвинения вплоть до  
бредовых

Гипобулия

Бессонница

Усиление тоски утром

Суицидальные тенденции



Рис. 24. Инволюционная меланхолия.

# Соматовегетативные проявления при депрессии

- Сухость кожных покровов, ломкость ногтей, волос
- выглядят старше своего возраста
- тахикардия
- колебания АД
- жар, холод
- запоры
- диспепсия
- снижение аппетита
- снижение массы тела
- разнообразные боли

# Депрессия

```
graph TD; A[Депрессия] --> B[По этиологии]; A --> C[По клинической картине]; B --- B1[● Эндогенная]; B --- B2[● Психогенная]; B --- B3[● Экзогенная]; C --- C1[● Тревожная (ажитированная депрессия)]; C --- C2[● апатическая]; C --- C3[● ипохондрическая]; C --- C4[● истерическая]; C --- C5[● маскированная (соматизированная, скрытая)];
```

По этиологии

- Эндогенная
- Психогенная
- Экзогенная

По клинической картине

- Тревожная (ажитированная депрессия)
- апатическая
- ипохондрическая
- истерическая
- маскированная (соматизированная, скрытая)

# Варианты депрессивного синдрома


- Тревожная (ажитированная депрессия)
- апатическая
- ипохондрическая
- истерическая
- маскированная (соматизированная, скрытая)
  
- Субдепрессия.

# Маскированная депрессия

- Преобладают жалобы соматического характера
- Несоответствие субъективных ощущений и объективных данных
- Нет эффекта от традиционного лечения
- Несмотря на неэффективность лечения больные ходят к врачу
- Эффект от терапии антидепрессантами

# Основные симптомы депрессии СОМАТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Встречаемость\*



\* При первом обращении к врачу

# Маниакальный синдром

Триада

- Гипертимия
- Ускорение мышления
- Двигательное возбуждение

Переоценка собственных способностей


Усиление всех влечений

Укорочение сна

Гневливая мания

Гипомания





**Ну хоть троечку**



Спасибо за внимание !

