

Введение:

- Наиболее важный процесс ассимиляции в клетке – синтез присущего ей белка.(очень энергоемкий процесс, берущий энергию от АТФ),(т.к. в процессе жизни все белки рано или поздно разрушаются,клетка должна непрерывно синтезировать белки для восстановления своих мембран , органоидов и т.п. , а особенно интенсивно синтез белка идет в клетках имеющих определенную функцию – это такие клетки как клетки желез внутренней секреции и т. п.)
- Многообразие функций белков определяется их первой структурой.А наследственная информация заключена в последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК.



■ АССИМИЛЯЦИЯ – НАБОР РЕАКЦИЙ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА КЛЕТКИ
(ПЛАСТИЧЕССКИЙ ОБМЕН И Т.П.).



Первичная структура-
последовательность аминокислот в
составе полипептидной цепи.




- Ген – участок ДНК в котором содержится информация о первичной структуре одного белка.



Генетический код:

- Генетический код – соответствие триплетных сочетаний нуклеотидов ДНК к той или иной из 20 аминокислот , входящих в состав белков; универсален для всех живых организмов.
- В состав ДНК входят 4 азотистых основания :аденин (А),гуанин(Г), тимин(Т),цитозин(Ц).
- Очень важное свойство генетического кода – 1 триплет всегда обозначает 1-у единственную аминокислоту



- ТРИПЛЕТ – последовательность из 3-х расположенных друг за другом нуклеотидов.



ТРАНСКРИПЦИЯ:


- Первый этап биосинтеза белка—транскрипция.
- **Транскрипция—это переписывание информации с последовательности нуклеотидов ДНК в последовательность нуклеотидов РНК.**



В определенном участке ДНК под действием ферментов белки-гистоны отделяются, водородные связи рвутся, и двойная спираль ДНК раскручивается. Одна из цепочек становится **матрицей** для построения мРНК. Участок ДНК в определенном месте начинает раскручиваться под действием ферментов.



Затем на основе матрицы под действием фермента РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ из свободных нуклеотидов по принципу комплементарности начинается сборка мРНК.




Между азотистыми основаниями ДНК и РНК возникают водородные связи, а между нуклеотидами самой матричной РНК образуются сложно-эфирные связи.



MyShared

ТРАНСПОРТНЫЕ РНК:

- Т.К. в состав белков входят около 20 аминокислот, существует столько же видов тРНК.
- Строение всех тРНК сходно.



- Служат для осуществления переноса аминокислотных остатков к матричной РНК




MyShared

ТРАНСЛЯЦИЯ

Второй этап биосинтеза – трансляция.

Трансляция – перевод последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот белка.

В цитоплазме аминокислоты под строгим контролем ферментов аминоацил-тРНК-синтетаз соединяются с тРНК, образуя аминоацил-тРНК. Это очень видоспецифичные реакции: определенный фермент способен узнавать и связывать с соответствующей тРНК только свою аминокислоту.




Далее тРНК движется к мРНК и связывается комплементарно своим антикодоном с кодоном мРНК. Затем второй кодон соединяется с комплексом второй аминоацил-тРНК, содержащей свой специфический антикодон.


Антикодон – триплет нуклеотидов на верхушке тРНК.

Кодон – триплет нуклеотидов на мРНК.

Водородные связи между комплементарными нуклеотидами



После присоединения к мРНК двух тРНК под действием фермента происходит образование пептидной связи между аминокислотами; первая аминокислота перемещается на вторую тРНК, а освободившаяся первая тРНК уходит. После этого рибосома передвигается по нити для того, чтобы поставить на рабочее место следующий кодон.



Такое последовательное считывание рибосомой заключенного в мРНК «текста» продолжается до тех пор, пока процесс не доходит до одного из стоп-кодонов (**терминальных кодонов**). Такими триплетами являются триплеты УАА, УАГ, УГА.

Одна молекула мРНК может заключать в себе инструкции для синтеза нескольких полипептидных нитей. Кроме того, большинство молекул мРНК транслируется в белок много раз, так как к одной молекуле мРНК прикрепляется обычно много рибосом.



Наконец, ферменты разрушают эту молекулу mRNA, расщепляя ее до отдельных нуклеотидов.



MyShared