

Южно-Казахстанская государственная  
фармацевтическая академия  
Кафедра биохимии, биологии и  
микробиологии


# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На тему: Система фибринолиза.  
Антикоагулянтная терапия.

ПОДГОТОВИЛА: ДЖАНИСБАЕВА М  
СТ. 414ФР  
ПРИНЯЛА: АБЛАЕВА З.Ю

# ПЛАН:

- Фибринолиз
- Внутренний и внешний путь активизации фибринолиза.
- Ингибирование фибринолиза.
- Регуляция фибринолиза.
- Список литературы.



**ФИБРИНОЛИЗ**  
(от Фибрин и греч. *lýsis* –  
разложение,  
растворение) - процесс  
растворения тромбов и  
сгустков крови.


Является важной защитной реакцией организма и предотвращает закупорку кровеносных сосудов сгустками фибрина.

Также фибринолиз способствует реканализации сосудов после прекращения кровотечения.

# Фибринолиз включает 4 компонента:



основной фермент – плазмин;



плазминоген (неактивный  
предшественник пламина);




активаторы плазминогена;



ингибиторы плазминогена

**ФИБРИНОЛИЗ** включает в себя

расщепление фибрина под  
воздействием плазмина,  
присутствующего в плазме крови в виде  
неактивного предшественника –  
плазминогена (2,2г/л).



**активируется  
одновременно с  
началом процесса  
свертывания крови.**




Схема фибринолиза. Синие стрелки - стимуляция; красные стрелки - подавление

**ВНЕШНИЙ ПУТЬ АКТИВАЦИИ** осуществляется при неотъемлемом участии тканевых активаторов, синтезирующихся преимущественно в эндотелии сосудов. К данным активаторам относят **тканевый активатор плазминогена (ТАП) и урокиназу.**

**ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ** осуществляется благодаря плазменным активаторам и активаторами форменных элементов крови — лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов.

## **ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ РАЗДЕЛЯЮТ НА**

### **Хагеман-зависимый фибринолиз**

- происходит под влиянием фактора XIIIa свертывания крови, калликрейна, которые вызывают превращение плазминогена в плазмин.

### **Хагеман-независимый фибринолиз**

- происходит наиболее быстро

**основным назначением является очищение сосудистого русла от нестабилизированного фибрина, который образуется в процессе внутрисосудистого свертывания крови.**

# ИНГИБИРОВАНИЕ ФИБРИНОЛИЗА

Фибринолитическая активность крови во многом определяется именно соотношением ингибиторов и активаторов процесса фибринолиза.

В плазме крови находятся также ингибиторы фибринолиза, подавляющие его

**$\alpha$ 2-антиплазмин** вызывает связывание плазмина, трипсина, калликреина, урокиназы, тканевой активатор плазминогена. Таким образом препятствуя процессу фибринолиза на его ранних и на поздних стадиях.

Сильный ингибитор плазмина является также  **$\alpha$ 1-протеазный ингибитор.**


фибринолиз тормозится **альфа2-макроглобулином, C1-протеазным ингибитором**, и целым рядом ингибиторов активатора плазминогена, вырабатываемых в эндотелии, а также фибробластами, макрофагами и моноцитами.




# РЕГУЛЯЦИЯ ФИБРИНОЛИЗА

- Между процессами свертывания крови и фибринолизом в организме поддерживается равновесие.
- УСИЛЕНИЕ ФИБРИНОЛИЗА обусловлено повышением тонуса симпатической нервной системы и поступлением в кровь адреналина и норадреналина. Это вызывает активацию фактора Хагемана, что запускает внешний и внутренний механизма продукции протромбиназы, а также стимулирует Хагеман-зависимый фибринолиз. Из эндотелия также происходит выделение тканевого активатора плазминогена и урокиназы, стимулирующих процесс фибринолиза.
- При повышении тонуса парасимпатической нервной системы наблюдаются также ускорение свертывания крови и стимуляция процесса фибринолиза.

Основным эфферентным регулятором процессов свертывания крови и фибринолиза является сосудистая стенка.



**А. Фибринолиз**



**АНТИКОАГУЛЯНТЫ** (от анти и лат. coagulans, род. падеж coagulantis — вызывающий свёртывание) — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность свёртывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов.



**АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ** относится к одному из наиболее востребованных в практической медицине подходов.

**АНТИКОАГУЛЯНТЫ (АК; АНТИТРОМБИНЫ, АНТИТРОМБОПЛАСТИНЫ)** –





высокоэффективные препараты, которые показаны в самых разных клинических ситуациях, от неотложных лечебных вмешательств до длительной поддерживающей и профилактической терапии.

- ЭФФЕКТ АНТИКОАГУЛЯНТОВ проявляется в улучшении реологических свойств крови и антитромботическом действии, поэтому целью антикоагулянтной терапии является ограничение начавшегося тромбоза и профилактика тромбоэмболических осложнений.
- Если тромбоэмболические осложнения уже возникли, то данная терапия способствует их ликвидации, уменьшает число рецидивов данного осложнения.

# Показания к АК-терапии

АК являются важнейшей составляющей базисной терапии

- острого коронарного синдрома,
- острых нарушений мозгового кровообращения,
- тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА),
- тромбозов глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК),
- пороков сердца,
- мерцательной аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.



# широко используются в общей хирургии для профилактики

- тромбозов в послеоперационном периоде;
- в гематологии и нефрологии для использования с устройствами экстракорпоральной детоксикации и автоматического плазмафереза, для заготовки компонентов крови человека.



# Назначение антикоагулянтов при терапии ДВС преследует следующие цели:



восстановление нормального гемостаза;

профилактика дальнейшего тромбообразования;

растворение образовавшихся тромбов и восстановление функций пораженных органов.



Таблица 1

## Классификация АК прямого действия

| Подгруппа   | Представители   |
|---|---|
| 1   | 2   |
| Зависимые от антитромбина III ингибиторы тромбина   |   |
| Нефракционированные гепарины                        | Гепарин   |
| Низкомолекулярные (фракционированные) гепарины      | Ардепарин;<br>дальтепарин;<br>надропарин;<br>парнапарин;<br>ревинарин;<br>сандопарин;<br>тинзапарин;<br>эноксапарин |
| Гепариноиды   | Сулодексид;<br>данапароид   |
| Независимые от антитромбина III ингибиторы тромбина |   |
| Гирудин (нативный и рекомбинантный)                 | Гируген;<br>гиролог;<br>бивалирудин   |

|              |  |
|--------------|--|
| Олигопептиды | Аргатробан;<br>иногатран;<br>новостан;<br>тромстоп;<br>эфегатран;<br>дабигатран;<br>ривароксабан |
|--------------|--|



- терапия АНТИКОАГУЛЯНТНЫМИ препаратами требует хорошо организованного контроля.
- Основное осложнение АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ– **кровотечение.**



# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Клиническая биохимия: учеб. Пособие для вузов/ под ред. В. А. Ткачука. -2-е изд., испр.и доп. –М., 2004.
- Тапбергенов С. О Медицинская биохимия: молекулярные механизмы физиологических функций: учеб. Для мед. Спец. Вузов-Астана, 2001
- Клиническая биохимия: учеб. Пособие/ А.Я. Цыганенко.-М., 2002.
- Егорова М. О. Биохимическое обследование в клинической практике: моногр. –М., 2008 г.
- 2. Ибрагимов У. К. Справочник по клинической биохимии: справ. Изд. – Ташкент, 1993.
- Физиология человека. Под ред. Покровского В.М., Коротько Г. Ф М.: Медицина, 1997; Т1- 448 с., Т2 - 368с
- Физиология человека. Учебник/Под ред. В. М. Смирнова.- М.: Медицина, 2002. - 608 с.: ил.(Учеб. лит. Для студентов мед. вузов). (стр. 231)

# ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ

- <http://yanko.lib.ru/>
- <http://medicinkoff.ru/>
- <http://www.labdiagnostic.ru/>
- <http://kardiolab.ru/>
- <http://www.nedug.ru/>
- <http://www.medkurs.ru/>
- <http://ru.wikipedia.org/>
- <http://medbiol.ru/>