



Кафедра:Интернатура және резидентура бойынша психиатрия мен наркология

Тақырып. Соматоформды бұзылыстар

Қабылдаған: Ашимов А.А

Орындаған: Токиева Қ.Т

Тобы: 613-01

*Соматоформды бұзылыс әр түрлі шағымдармен көрініс беретін, бірақ медициналық тексеріс кезінде аурудың анықталмауымен жүретін психосоматикалық бұзылыс.





Этиологиясы



- * Стress
- * Өмірдегі жағымсыз оқиғалар
- * Қандайда бір жанжалдар, ұрыс керістер



- * С.Б науқастар әр түрлі шағыммен келуі мүмкін.
- * Журек, асқазан тұсында ауру сезімі
- * Бас ауру
- * Ішінде кескен тәрізді ауру сезімі
- * Тыныс алудың жиілеуі
- * Бұлшықетте, буында ауру сезімі
- * Аяқ - қолда әлсіздік

*** Соматоформды бұзылыстың симптомдары**




*Классификация

1. Соматизирленген бұзылыс
2. Ипохондриялық бұзылыс
3. Соматоформды вегетативті дисфункция
4. Созылмалы соматоформды ауру сезімді бұзылыс
5. Дифференцияланбаған соматоформды бұзылыс

- * Науқаста дененің бөліктерінде сезімталдықтың бұзылыстары
- * Қимыл - қозғалыстың координацияның бұзылыстары
- * Жүйе бойынша: кеуде тұсында ауру сезімі, жүктемесіз ентігу. Асқазан ішек жүйесі: жүрек айну, құсу, іштің керілуі, іштің өтуі. Соматизирленген бұзылыс көбіне стресс кезінде немесе стресстен кейін пайда болады.
Ағымы ***** созылмалы.

Соматизирленген бұзылыс



- * Науқастар спецификалық емес немесе ауыспалы шағымдар айтады.
- * Жоғары терлегіштік
- * Аяқ - қолдың дірілдеуі
- * Терінің қызаруы
- * Журектің қағуы
- * Белгілі бір ағзалардың ауруымен байланыстырады.
- * Бірақ обьективті тексеріс кезінде анықталмайды

Соматоформды вегетативті дисфункция

*Ауырсыну сезімі орны бойынша тұрақты, интенсивті спонтанды түрде басталады. Ауырсыну сезімінің уақыттары жылдан бірнеше жылға созылады



Ипохондриялық бұзылыс

*Емі жоқ дерттің бар екеніне сенімділік. Қатерлі ісік, ЖИА. Осының әсерінен әртүрлі фобиялар пайда болады

*Созылмалы соматоформды ауру сезімді бұзылыс



1. Бірінші науқасқа психокотерапиялық көмек. Науқастын ойын, әлемге көз қарасын, өзінің ауруына, қоғамға адаптациялануына көмек беру.
2. Дәрілік препараттар
 - * Транквилизаторы (феназепам, элениум) – эти препараты обладают противотревожным, успокаивающим действием, помогают справиться с навязчивыми мыслями, страхами, повышенной мнительностью. Транквилизаторы рекомендуют назначать короткими курсами (до 1,5 недель).
 - * Антидепрессанты (циталопрам, флуоксамин, амитриптилин) устраниют сниженное настроение, эмоциональную заторможенность, способствуют повышению работоспособности.
 - * Нейролептики, обладающие противотревожным действием (сонапакс, труксал). К применению этих препаратов прибегают при неэффективности транквилизаторов, при выраженной тревоге, сочетающейся с возбуждением.
 - * Бета-блокаторы (атенолол, пропранолол) назначают для лечения вегетативных симптомов, таких как повышенная потливость, учащенное сердцебиение, дрожь.
 - * Препараты, стабилизирующие настроение (карбамазепин), могут назначаться при хроническом течении заболевания, наличии у пациентов выраженных перепадов настроения, при нарушениях вегетативной регуляции.
 - * Лечение соматоформных расстройств должно проводиться длительно (не менее месяца), с постепенным переходом на поддерживающую дозу и плавной отменой препаратов. При кратковременном лечении и быстрой отмене препаратов симптомы заболевания могут быстро возобновиться.



* Пайдаланылған әдебиеттер

1. Психиатрия Жариков Н.М Алматы 2010 ж
2. Психиатрия и наркология Н.Н Иванец
3. <http://psi-doctor.ru/nevrozy-i-psixosomaticheskie-rasstrojstva/somatoformnoe-rasstrojstvo-prichiny-simptomy-lichenie.html>