

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОМИКОЗОВ



Махмуд Асиф
Врач-дерматовенеролог РКВД г. Йошкар-Ола

Группы антимикотиков



Полиены

□ Нистатин

- (табл. 250 и 500 тыс.ед.; табл. вагин. 100 тыс.ед; мазь 100 тыс.ед/г)

□ Леворин

- (табл. 500 тыс.ед.; табл. вагин. 250 тыс.ед; мазь 500 тыс.ед/г)

□ Натамицин (пимафуцин)

- (табл. 100 мг.; свечи. вагин. 100 мг; крем 2%)

**Применяются местно и внутрь,
при кандидозе кожи, слизистой
оболочки ЖКТ, генитальном
кандидозе,**



Полиены

□ Амфотерицин В

- (пор. д/инф. 0,05 г во флак.; мазь 3%)

Показание: Тяжелые формы системных микоз

Противопоказания: Нарушения функции печени, нарушения функции почек, сахарный диабет. Все противопоказания относительны, поскольку амфотерицин В практически всегда применяется по жизненным показаниям.

□ Амфотерицин В липосомальный (амбизом, амфолип)

- (пор. д/инф. 0,05г)

Современная лекарственная форма амфотерицина В, отличается лучшей переносимостью



АЗОЛЫ (для системного применения)

- Кетоконазол (Низорал)
 - (табл. 0,2 г; крем 2% ; шамп. 2% во флак.)

Взрослые: 0,2–0,4 г/сут в 2 приема.

Крем наносят на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки в течение 2–4



Шампунь используют при себорейной экземе и перхоти — 2 раза в неделю в течение 3–4 нед, при отрубевидном лишае — ежедневно в течение 5 дней (наносят на пораженные участки на 3–5 мин, затем смывают водой)



АЗОЛЫ (для системного применения)

- Итраконазол (Орунгал, Ирунин)
 - (капс. 0,1 г; р-р д/приема внутрь 10 мг/мл во флак. по 150 мл)


Показание: Дерматомикозы, Отрубевидный лишай, кандидоз кожи и слизистых оболочек, онихомикозы ногтей, глубокие микозы.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, тяжелые нарушения функции печени, возраст



Азолы (для системного применения)

- Флуконазол (Дифлюкан, Флюкостат)
 - (капс. 0,05г, 0,1г, 0,15г: пор. д/сусп. д/приема внутрь 10 и 40 мг/мл во флак. по 50 мл; р-р д/инф. 2 мг/мл во флак. по 50 мл)



Противопоказания:

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. азольным противогрибковым ЛС в анамнезе).

С осторожностью: Печеночная и/или почечная недостаточность, алкоголизм, беременность, период лактации, детский возраст (до 6 мес – безопасность и эффективность применения не установлены)

Азолы (для местного применения)

Клотримазол

(табл. вагин. 0,1 г; крем 1%; р-р д/нар. 1% во флак. по 15 мл.)



Бифоназол (Бифосин, Микоспор)

(крем 1% в тубах по 15, 20 и 35 г; крем 1% в наборе для лечения ногтей; р-р д/нар. 1% во флак. по 15 мл)




Эконазол (Экодакс)

(крем 1% в тубах по 10 и 30г; аэроз. 1% во флак. по 50 г; свечи вагин. 0,15 г)

АЗОЛЫ (для местного применения)

- Изоконазол (Гино-Травоген, Травоген)
 - (крем 1% в тубах по 20г и 50г; свечи вагин. 0,6 г)
- Оксиконазол (Мифунгар)
 - (крем 1% в тубах по 30 г)



Аллиламины

- Тербинафин (Ламизил, Ламикан, Термикон)
 - (табл. 0,25 г; крем 1% в тубах по 15 г; спрей 1% во флак. по 30 мл)
- Нафтифин (Экзодерил)
 - (табл. 0,125 г; крем 1% в тубах по 15 г; спрей 1% во флак. по 10 мл)



15



флак. по 10 мл)



ОМ



Препараты разных групп



- Гризеофульвин

- (табл. 0,125 г и 0,5г.)

- Калия Йодид

- (пор. (используется в виде р-ра 1 г/мл)



- Аморолфин (Лоцерил)

- (лак д/ногтей 5% во флак. по 2,5 мл (в комплекте тампоны, лопатки и пилки для ногтей)



- Циклопирокс (Батрафен)

- (лак и крем)

Эхинокандины

- Каспофунгин
 - (лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг, 70 мг: фл.)



При лечении грибковых болезней необходимо соблюдать несколько общих правил:

- Лечение начинают только после лабораторного подтверждения диагноза.
- При поражении кожи используется любое противогрибковое средство для наружного применения 1–3 раза в день до исчезновения клинических проявлений, затем 1 раз в день в течение 2–4 недель для профилактики рецидивов заболевания.
- При поражении придатков кожи (волос, ногтей) применяют системную терапию.
- Обязательно проводятся профилактические мероприятия.



Спасибо за
внимание!