

# Созылмалы миелолейкоздың емі

- Ем жоспары:
- 1.Цитостатикалық ем : 1.1Монотерапия:
- Лейкоздың жасырын кезеңінде тағайындалады.
- Гидреа-0,5г -1капс\*3рет.
- Қарсы көрсеткіш:
- Лейкопения (лейкоцит 3.0-тен төмен)
- Тромбоцитопения (тромбоцит 100-ден төмен).

- 2.Миелосан - 0.002г 1табл\*3рет
- Препаратқа көрсеткіш:гидреа эффект бермеген жағдайда.
- Жағымсыз әсері:өкпе тінінің фиброзы,тері пигментациясы,ерлерде жыныстық қызметінің тежелуі.
- Миелобромол -0.25г табл.  
Тәул\доза-125-250мг.
- Көрсеткіш:миелосан әсерінің жеткіліксіздігі, миелосанмен емдеу барысында лейкоцитоздың жоғарылауы.

- 1.2. Полихимиотерапия: Цитозар-30мг\м<sup>2</sup> б\етке 1-ші,8-ші күндері.
- Метотрексат12мг\м<sup>2</sup> б\е 2-ші,5-ші,9-ші күн
- Винкристин-1.5мг\м<sup>2</sup> венаға3-ші,10-шы күн
- 6-Меркаптопурин-60мг\м<sup>2</sup> күнделікті ішуге
- Преднизолон-50-60мг ішуге  
(тромбоцитопения-100-ден төмен болса).
- 2.Альфа-2-интерферон-4млн ХБ\м<sup>2</sup> тері астына 10күн, 3млн ХБ\м<sup>2</sup> аптасына 2рет 10күн, аптасына 1рет бай.

- 3. Сәулелік ем
- 4. Лейкоцитаферез
- 5. Спленэктомия
- 6. Симптоматикалық ем (анемия, инфекциялық асқынуларды емдеу, дезинтоксикациялық ем).
- 7. Сүйек кемігінің трансплантациясы.