

Созылмалы миелолейкоздың емі

- Ем жоспары:
- 1.Цитостатикалық ем : 1.1Монотерапия:
- Лейкоздың жасырын кезеңінде тағайындалады.
- Гидреа-0,5г -1капс*3рет.
- Қарсы көрсеткіш:
- Лейкопения (лейкоцит 3.0-тен төмен)
- Тромбоцитопения (тромбоцит 100-ден төмен).

- 2. Миелосан - 0.002г 1табл*3рет
- Препаратқа көрсеткіш: гидреа эффект бермеген жағдайда.
- Жағымсыз әсері: өкпе тінінің фиброзы, тері пигментациясы, ерлерде жыныстық қызметінің тежелуі.
- Миелобромол -0.25г табл.
Тәул\доза-125-250мг.
- Көрсеткіш: миелосан әсерінің жеткіліксіздігі, миелосанмен емдеу барысында лейкоцитоздың жоғарылауы.

- 1.2. Полихимиотерапия: Цитозар-30мг\м² б\етке 1-ші,8-ші күндері.
- Метотрексат12мг\м² б\е 2-ші,5-ші,9-ші күн
- Винкристин-1.5мг\м² венаға3-ші,10-шы күн
- 6-Меркаптопурин-60мг\м² күнделікті ішуге
- Преднизолон-50-60мг ішуге
(тромбоцитопения-100-ден төмен болса).
- 2.Альфа-2-интерферон-4млн ХБ\м² тері астына 10күн, 3млн ХБ\м² аптасына 2рет 10күн, аптасына 1рет бай.

- 3.Сәулелік ем
- 4.Лейкоцитаферез
- 5.Спленэктомия
- 6.Симптоматикалық ем (анемия, инфекциялық асқынуларды емдеу, дезинтоксикациялық ем).
- 7.Сүйек кемігінің трансплантациясы.