



# СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

# Место в классификации




- Основные причины кишечной непроходимости:
  - а — ущемление;
  - б — инвагинация;
  - в — спаечная «удавка»;
  - г — заворот;
  - д — закупорка опухолью;
  - е — закупорка желчным камнем

# Спаечная болезнь




Спаечной болезнью называют патологические состояния, связанные с образованием спаек в брюшной полости при ряде заболеваний, при травматических повреждениях внутренних органов, в т. ч. при операционной травме

# История



- В 1914 году немецкий хирург Эрвин Пайр опубликовал 157 случаев спаек брюшной полости после различных вмешательств и впервые поставил вопрос о необходимости профилактики развития спаек

# История



- Н. И. Пирогов, первым в России выполнивший операцию под эфирным наркозом по поводу странгуляционной тонкокишечной непроходимости

# Патогенез




- Установлено: в основе спаечного процесса лежат нарушения функции брюшины, связанные с гипоксией, развивающейся вследствие длительного воспалительного процесса, что приводит к нарушению ее фибринолитической функции



# Патогенез





- . По данным ряда авторов, 1% перенесших операции на органах брюшной полости ежегодно лечатся от спаечной болезни. Внутрибрюшные сращения после манипуляций хирурга на органах брюшной полости возникают в 80–90% случаев.