

Засоби, які впливають на функцію органів травлення



частина1

Серед речовин, які впливають на функції органів травлення, виділяють такі групи лікарських препаратів:

- засоби, що впливають на апетит;
- блювотні і протиблювотні засоби;
- засоби, що застосовують при порушенні функцій залоз шлунка;
- гепатотропні засоби;
- засоби, що застосовують при порушенні екскреторної функції підшлункової залози;
- проносні засоби;
- засоби, що впливають на моторну функцію кишечника

Полин гіркий


Золототисячник
малий

Деревій звичайний

Гіркоти




Фепранон (Phergranon) .
Випускається в таблетках по 0,025 г



Механізм дії блювотних та протиблювотних засобів:

- - аферентні нервові волокна;
- - засоби, що спричиняють блювоту;
- - протиблювотні засоби.

Механізм дії блювотних та протиблювотних засобів



Метоклопрамід (Metoclopramide), реглан або церукал
Форма випуску: таблетки по 0,01 г, ампули по 2 мл 0,5 % розчину.



Мотіліум (Motilium) .
Випускається в таблетках по 0,01 г

Засоби, що посилюють секрецію шлунку :

- **З діагностичною ціллю:** *кофеїн, гістамін, гастрин.*
- **З лікувальною ціллю:** *сік подорожника, плантаглюцит, натуральний шлунковий сік, пепсин, хлористоводнева кислота.*

Засоби, що понижують секрецію шлунка :

- **Засоби, що блокують холінорецептори:**
 - М-холіноблокатори (неселективні холінолітики): *атропіну сульфат*
 - М₁-холіноблокатори вибіркової дії (селективні холінолітики): *гастроцепін*
 - Гангліоблокатори: *пірілен, бензогексоній*
- **Засоби, що блокують гістамінові-Н₂-рецептори:** *циметидин, ранітидин, фамотидин, нізатидин, рексатидин*
- **Інгібітори протонової помпи:** *омепразол, контролок*
- **Простагландини та їх синтетичні похідні:** *мізопростол*
- **Антацидні засоби:**
 - Системні: *натрію гідрокарбонат*
 - Несистемні: *алюмінію гідроксид, магнію оксид, альмагель, маалокс, ренні*
- **Гастропротектори:**
 - Препарати, що створюють механічний захист слизової оболонки шлунка: *сукралфат, де-нол*
 - Препарати, що підвищують захисну функцію слизового бар'єру і стійкість слизової оболонки до дії пошкоджуючого фактора: *карбеноксолон, мізопростол*



Атропіну сульфат (Atropini sulfas).

порошок для приготування 0,5 % і 1 % очних крапель, 1% очна мазь, таблетки по 0,0005 г, ампули по 1 мл 0,1 % розчину.



Гастроцепін (Gastrocerinum)

Форми випуску: таблетки по 0,025 г і 0,05 г; ампули по 0,01 г сухої речовини.



Циметидин

Формы выпуска: таблетки по 0, 2 г.



Ранітидин (Ranitidin)

Випускається в таблетках по 0,15 г і 0,3 г і ампулах по 2 мл 2,5 % розчину.




Фамотидин (Famotidin)

Форми випуску: таблетки по 0,02 г і 0,04 г.




Омепразол (Omeprazole)
Форма випуску – капсули по 0,02 г.





Альмагель (Almagel)

комбінований препарат, до складу якого входить гель алюмінію гідроксиду, магнію оксид і Д-сорбіт.
Випускається у флаконах по 170 мл.



Антацидні засоби





Маолокс (Maalox)

комбінований препарат, до складу якого входить гель алюмінію гідроксиду, магнію гідроксид.



Сукральфат (Sucralfate)

Форми випуску: таблетки по 1г



Де-нол (De-nol)

Формы выпуска: таблетки по 0,12 г.



Пілобакт

Омепразол + Кларитроміцин + Тинідазол

Схеми комбінованого лікування виразки шлунка

- Де-нол + амоксицилін
- Де-нол + метронідазол
- Омепразол + амоксицилін + кларитроміцин
- Де-нол + кларитроміцин + метронідазол
- Омепразол + кларитроміцин + амоксицилін + метронідазол

Засоби, які впливають на функцію органів травлення



частина2

Серед речовин, які впливають на функції органів травлення, виділяють такі групи лікарських препаратів:


- засоби, що впливають на апетит;
- блювотні і протиблювотні засоби;
- засоби, що застосовують при порушенні функцій залоз шлунка;
- гепатотропні засоби;
- засоби, що застосовують при порушенні екскреторної функції підшлункової залози;
- проносні засоби;
- засоби, що впливають на моторну функцію кишечника

Класифікація жовчогінних засобів:


- **Препарати, що стимулюють жовчоутворення (холеретики, холесекретики)**
- Препарати, що збільшують секрецію жовчі та стимулюють утворення жовчних кислот (*істинні холеретики*)
- а) препарати, що містять жовчні кислоти (*алохол, холензим*)
- б) синтетичні препарати (*нікодин, оксафенамід*)
- в) препарати рослинного походження (*безсмертник піщаний, кукурудзяні приймочки, м'ята перцева, піжмо, шипшина, холагол*)
- Препарати, що збільшують секрецію жовчі переважно за рахунок водного компоненту (*гідрохолеретики: мінеральні води, препарати валеріани*)
- **Препарати, що стимулюють жовчовиділення (холекінетики)**
- Препарати, які викликають підвищення тону жовчного міхура та зниження тону жовчних шляхів (*холекінетики: сульфат магнію, сорбіт, барбарис звичайний*).
- Препарати, що викликають розслаблення тону жовчних шляхів (*холеспазмолітики: М-холіноблокатори, еуфілін, нітрогліцерин*).



Алохол (Allocholum)



**Кукурудзяні
приймочки**



**Безсмертник
піщаний**




Шипшина

Препарати рослинного походження



Холагол



Фармакодинаміка магнію сульфату залежно від способу застосування

Клінічна класифікація антиоксидантів

- Антиоксиданти прямої дії
 - Препарати, які містять вітамін Е (*токоферолу ацетат, аевіт*)
 - Препарати вітаміну С (*аскорбінова кислота, галаскорбін, аскорутин*)
 - Біофлавоноїди (*легалон, фламін, флакумін, силібор, конвафлавін*)
 - Препарати, які містять тіолові групи (*унітіол, тіосульфат натрію*)
- Антиоксиданти непрямої дії
 - Засоби, які регулюють фосфоліпідний склад клітинних мембран (*есенціале, ліпін, ретинол, аевіт*)
 - Попередники піридиннуклеотидів (*кислота нікотинова, нікотинамід*)
 - Попередники глутатіону (*метіонін, цистеїн, кислота глютамінова*).
 - Препарати, які індукують глутатіонпероксидазу (*селеновмісні препарати*)
 - Інші засоби, які підвищують антиокислювальний потенціал крові і тканин (*кислота ліпоєва, ліпамід, органопрепарати печінки*)



Токоферолу ацетат (Tocopheroli acetate)

Випускається вітамін Е у багатьох лікарських формах, зокрема в 5 %, 10 % і 30 % олійних розчинах у флаконах по 10, 20 і 50 мл; в еластичних капсулах по 0,1 і 0,2 мл 50 % розчину в маслі; в ампулах по 1 мл 5 %, 10 % і 30 % олійних розчинів.



Розторопша плямиста



Карсил (Carsil)



Легалон (Legalon)



Механізм дії легалону



Есенціале (Essentiale)

Випускається в ампулах по 5 мл і в капсулах



Ліпостабіл




Панкреатин (Pancreatinum)


Випускається в драже (в таблетках) по 0,25 г і 0,5 г.



Панзинорм форте (Panzynorm forte)



**Фестал, Ензістал,
Мезим-форте**




Но-шпа, никошпан



Баралгін



Крушина звичайна



Бісакодил




Гутталакс



Плоди чорниць

Трава звіробою



М'ята перцева



Ромашка аптечна

