



# Старческий психоз

**ПСИХО́З— ЯВНО ВЫРАЖЕННОЕ  
НАРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ  
ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ГРУБО  
ПРОТИВОРЕЧАТ РЕАЛЬНОЙ  
СИТУАЦИИ (ПО И. П. ПАВЛОВУ), ЧТО  
ОТРАЖАЕТСЯ В РАССТРОЙСТВЕ  
ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО МИРА**

# **Спутниками психоза являются:**

- бредовые состояния;
- резкие изменения настроения;
- галлюцинации;
- состояния возбуждения;
- неподдающиеся контролю либо депрессивное поведение.

**\* Старческие психозы – группа этиологически разнородных психических болезней, возникающих обычно после 60 лет; проявляются состояниями помрачения сознания и различными эндоформными (напоминающими шизофрению и маниакально-депрессивный психоз) нарушениями.**

# ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕ ФОРМЫ СТАРЧЕСКОГО ПСИХОЗА:

- **острые формы** - проявляются помрачением сознания;
- **хронические** – возникновением паранойяльных, депрессивных, галлюцинаторных и парафренных состояний.

# Причины острой формы старческого психоза:

недостаток витаминов  
сердечная недостаточность  
болезни мочеполовой системы  
заболевания верхних дыхательных путей  
недостаток сна  
гиподинамия  
снижение слуха и зрения.

# **ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СТАРЧЕСКОГО ПСИХОЗА:**

**Депрессивные состояния**

**Паранойяльные состояния**

**Галлюцинозы**

**Галлюцинаторно-параноидные  
состояния**

**Старческая парафрения (конфабулез)**

# **Выделяют три основных типа старческого психоза:**

Болезнь Пика

Болезнь Альцгеймера

Старческое слабоумие



# ***БОЛЕЗНЬ ПИКА***

**ВСТРЕЧАЕТСЯ ГОРАЗДО РЕЖЕ ДРУГИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА,  
АТРОФИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ, ОДНАКО  
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ,  
ПРОГРЕССИВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ  
СРАВНИТЕЛЬНО БЫСТРО ПРИВОДИТ К ПОЛНОМУ  
РАСПАДУ ЛИЧНОСТИ.**

**Еще одним характерным признаком  
болезни является возраст, при котором  
активируются прогрессирующие изменения  
– 50-60 лет, причем последующая  
продолжительность жизни не превышает  
6, реже – 8 лет.**

# Основу симптоматики болезни Пика представляют :

- Изменение личности;
- Вялость, апатия;
- Пропадает инициатива и яркость эмоциональных реакций;
- Ухудшается эффективность мышления;
- Пропадает способность к самокритике;
- Нарушение письма;
- Постепенно развивается неспособность к различению предметов, понимания их назначения.

# Болезнь Альцгеймера

Наиболее часто встречаемое заболевание с симптомами сенильной деменции, поражающее теменные, височные участки долей головного мозга и поясную извилину.

Обнаруживают болезнь Альцгеймера, в среднем, в возрасте от 65 лет, однако науке известны редчайшие случаи более раннего заболевания.

# Для болезни Альцгеймера характерны СИМПТОМЫ:

**Нарастающие нарушения памяти;**

**Чувство растерянности, недоумения;**

**Потеря ориентации в пространстве;**

**Потеря знаний, опыта, навыков;**

**В конечной стадии – нарушение походки,  
судорожные припадки.**

# Старческое слабоумие.

В данном случае происходит атрофия головного мозга и медленный распад психической деятельности.

Болезнь развивается незаметно.

Старческое слабоумие может представлять собой отдельное заболевание или являться одним из симптомов или этапов других заболеваний, встречающихся в более раннем возрастном периоде.

Болезнь встречается у пациентов 70-75-летнего возраста.

## СИМПТОМЫ СТАРЧЕСКОГО СЛАБОУМИЯ :

- Происходит утривание черт характера;
- Нарушение процессов мышления;
- Нарастание расстройства памяти;
  - Происходит сдвиг в прошлое;
    - Потеря веса;
  - Неврологические симптомы;
    - Бредовые идеи.

Стоит отметить, что атрофические поражения нервных клеток являются процессом необратимым и устойчивым, поэтому методов излечения при старческой деменции не существует. Вся медикаментозная и психотерапия направлена на поддержку пациента и некоторое облегчение симптомов заболевания