

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
«АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

# Тактика ведения больных с микроспорией в АКВД за 2012-2014 годы

Выполнил студент гр:ЛД-11В

Поляков М.Е

Проверила научный руководитель:

Дмитриева Л.И

# М И К Р О С П О Р И Я



грибковое заболевание, при котором чаще всего поражаются кожа и волосы, очень редко ногти. Название происходит от возбудителя – гриб рода *Microsporum*.



- Цель:

изучение тактики ведения  
больных на основании данных за  
2012-2014 годы в АКВД

# задачи

- изучить теоретические аспекты микроспории: классификацию, клинику, лечение;
- исследовать карты стационарных больных микроспорией, на предмет тактики лечения микроспории в АКВД
- изучить статистику данных заболеваемости микроспорией, среди населения в АКВД за 2012-2014 года;
- провести анкетирование среди пациентов Альметьевского кожно-венерологического диспансера (АКВД) на предмет их знакомства с заболеванием микроспорией;
- дать рекомендации по профилактике микроспории.

# Клиника

- Инкубационный период составляет в среднем 8-12 дней.
- На гладкой коже появляются красные пятна, хорошо очерченной формы - с более бледным шелушащимся центром и периферическим возвышающимся ободком (валиком) с мелкими пузырьками, корочками.



# Диагностика

Для ранней диагностики и выявления больных микроскопией ценным является использование люминисцентной установки.





## При лечении микроспории:

1.гладкой кожи без поражения волос применяют наружные противогрибковые препараты. Используют традиционные 10–20% серную, 10% серно-3% салициловую или 10% серно-дегтярную мази.



## 2. Лечение микроспории волосистой части головы



При лечении этой формы заболевания до сих пор препаратом выбора остается гризеофульвин – антибиотик, продуцируемый плесневым грибом. Гризеофульвин, выпускаемый в виде таблеток по 125 мг. Препарат принимают ежедневно в 3–4 приема во время еды с чайной ложкой растительного масла, которое необходимо для повышения растворимости гризеофульвина и увеличения длительности его действия. Общий курс лечения составляет 1,5–2 месяца.



Исследование  
статистических данных,  
полученных на базе  
альметьевского кожно-  
венерологического  
диспансера (АКВД) за  
2012-2014 гг.




Диаграмма 1. Заболеваемость микроспорией детей в возрасте от 0 до 14 лет (2012 – 2014 гг.)




Диаграмма 2. Заболеваемость микроспорией среди подростков (15 – 17 лет) (2012 – 2014 гг.)




Диаграмма 3. Заболеваемость микроспорией среди взрослых (2012 – 2014 гг.)





Диаграмма 4. Общая заболеваемость микроспорией среди всех возрастов, зарегистрированная в 2012 – 2014 гг. в АКВД

# Анкетирование пациентов Альметьевского кожно- венерологического диспансера (АКВД) на предмет заболеваемости микроспорией


- На предмет знакомства пациентов с таким заболеванием как микроспория было проведено исследование, в котором на добровольной основе приняли участие 60 человек, среди них 30 женщин и 30 мужчин.

# Диаграмма 5. Знание пациентов возбудителя микроспории




# Диаграмма 6. Знание респондентов путей передачи микроспории

■ знают    ■ не знают



## Диаграмма 7.Количество респондентов, переболевших микроспорией.



# Заключение

В квалификационной работе были полностью решены поставленные задачи:

- 1) изучены теоретические аспекты микроспории: классификацию, клинику, лечение;
- 2) исследованы карты стационарных больных, на предмет тактики лечения микроспории в АКВД, и сравнение их со стандартами лечения микроспории
- 3) изучена статистика данных заболеваемости микроспорией, среди населения в АКВД за 2012-2014 года
- 4) проведено анкетирование среди пациентов Альметьевского кожно-венерологического диспансера (АКВД) на предмет их знакомства с микроспорией. В результате анкетирования было выявлено, что определенная часть пациентов не знакомы с данным заболеванием.
- 5) по итогам исследования даны рекомендации по профилактике микроспории, которые очень доступны для всех и каждого.

Рекомендации по профилактике микроспории,  
которые доступны для всех и каждого:

- обязательно мыть руки после улицы;
- не пользоваться чужой одеждой, расческой;
- не трогать бродячих животных;
- не заниматься самолечением;
- особое внимание уделить детям вернувшимся из лагерях и сельской местности.



**Спасибо за внимание**