

Tuberkuloze

Jekaterina Nuždina
M2R

- Tuberkuloze (TB) ir ārstējama infekcijas slimība.
- Tuberkulozes ierosinātāju – tuberkulozes bacili – apkārtējā vidē izdala ar plaušu tuberkulozi slims cilvēks elpojot, runājot, šķaudot vai klepojot.

- Slimība visbiežāk skar plaušas, taču ar asins vai limfas straumi var izplatīties organismā un attīstīties arī citās ķermeņa daļās, piemēram, – nierēs, kaulos, limfmezglos, smadzenēs.

• KĀDI IR TUBERKULOZES SIMPTOMI?

- klepus trīs nedēļas un ilgāk,
- klepus ar krēpām, ar vai bez asins piejaukumu,
- ilgstošs nogurums,
- nespēks,
- svīšana naktīs,
- krišanās svarā,
- paaugstināta ķermeņa temperatūra,
- sāpes krūtīs.

Diagnostika

- Krušukurvja RTG
- Krēpu mikroskopija un uzsējums
- Fibrobronhoskopija, bronhu skalojuma bakteriologiskā izmēklēšana

ĀRSTĒŠANA

- JO SAVLAICĪGĀK TIEK DIAGNOSTICĒTA TUBERKULOZE, JO ĀTRĀK UN LABĀK TO VAR IZĀRSTĒT!
- Tuberkulozi var sekmīgi izārstēt un tās izplatīšanos sabiedrībā var apturēt, ievērojot samērā vienkāršus noteikumus:
 - tuberkulozes zāles jālieto regulāri un tik ilgi, kamēr ārsts apstiprina izveseļošanos,
 - ārstēšanās laikā jālieto pilnvērtīgs uzturs un

- Stacionāra (infekciozie slimnieki, kas izdala mikrobaktērijas, līdz laikam, kamēr krēpu iztriepē vai bronhu skalojuma vairs neatrod mikobaktērijas)
- Ambulatori(stingrā medicīnas darbinieku kontrole)
- Pirmās rindas medikamenti :
Izoniazīds, Rifampicīns , Pirazinamīds,
Streptomīcīns

Paldies par uzmanību!