



# Вирусы гепатита человека

## Вирус гепатита А (ВГА, HAV)



LIVER

Иммунологическое повреждение



Инфекции:

- Бактериальные
- Вирусные
- Грибковые
- Протозойные




Токсическое повреждение:

- Алкогольное
- Лекарственное
- Яды/химикаты



- Вирусный гепатит А (ВГА) – антропонозное инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, первичным поражением печени и синдромом интоксикации




# ВГА. Таксономическое положение.

Семейство **Picornaviridae**

Род **Hepatovirus**



Вид **Вирус гепатита А (ВГА, HAV)**



ВГА. Электронная  
микрофотография

# ВГА. Морфология вириои


- ❑ Маленький, безоболочечный
- ❑ При иммуноэлектронной микроскопии выявлены частицы двух типов «пустые» (без РНК) и «полные» диаметром 27–32 нм
- ❑ Капсид икосаэдрической симметрии
- ❑ Расположен непосредственно вокруг РНК



Икосаэд  
р





Сферическая  
форма  
вириона





# В1 А. Морфология вириона


- Капсид образован 4 структурными белками: VP1, VP2, VP3
- Белок VP4 расположен на внутренней стороне и необходим для сборки капсида, не определяется в зрелом вирионе
- VP1+ VP2+ VP3+ VP4= протомер
- 5 протомеров= пентамер
- 12 пентамеров= капсид



# VI A. Морфология вириона



a  
b  
Электронная  
микрофотография

 Feng Z, et al. 2014.  
Annu. Rev. Virol. 1:539–60

a – безоболочечный вирион

b – квази-оболочечный вирион eHAV

c – оболочечный вирус

Квази-оболочечный вирион:


- не имеет вирусных гликопротеинов в липидной оболочке
- содержит уникальный VP1pX белок

- Безоболочечные вирионы обнаруживаются в желчи и испражнениях, что обеспечивает большую устойчивость во внешней среде.
- В крови вирус гепатита А представлен в квази-оболочечной форме eHAV (англ. enveloped – оболочечный).
- У настоящих оболочечных вирусов липидная оболочка обязательно содержит вирусные гликопротеины, eHAV не имеет таковых, не содержит в составе капсида VP1, а в состав пентамера входит уникальный белок VP1pX.
- Клеточная протеаза вырезает pX из VP1 на завершающей стадии вирусного морфогенеза.
- Сама липидная оболочка имеет клеточное происхождение.




# Организация генома ВГА

Организация генома ВГА




- Геном: однонитевая +РНК (выполняет матричную функцию)
- Одна рамка считывания
- 5`-НТР (5`-нетранслируемая область):
  - самый консервативный участок
  - Связан с вирусным белком VPg
  - Является критичным для репликации Р<sub>1</sub>, Р<sub>2</sub>, Р<sub>3</sub>
  - Содержит структуру IRES – внутренний сайт посадки рибосом
- P1, P2, P3 – рамка считывания
- 3`-НТР- короткая, заканчивается



IRES  
(англ. *Internal Ribosome Entry Site*)

# Гетерогенность генома ВГА

- Геном НАV обладает высокой стабильностью
- 1 серотип
- 5 генотипов по результатам секвенирования РНК ВГА различных штаммов вируса
- ВГА, различающиеся по последовательностям от 15 до 25%, - **генотипы** вируса, различия в 7,5% внутри генотипа - **субтип** ВГА.



## Взаимосвязь генотипов ВГА

В нашей стране доминирует IA, при этом выявляемые субтипы IA и IIIA могут быть как эндемичными, так и завозными.

# Резистентность вируса

Один из наиболее устойчивых вирусов человека к факторам внешней среды




HEPATITIS A VIRUS

Устойчив к:	Чувствителен к:
Кислым рН Жировым растворителям Низким температурам Кипячению	Формалину Хлору Ультрафиолету

Стерилизация: автоклавирование (120°C) 20 мин., сухой жар – 1 час.


# Взаимодействие с клеткой



- Вирус проникает в клетку путём **виропексиса** (рецептор-опосредованный эндоцитоз)


- ВГА взаимодействует со специфическим рецептором **HAVCR1** (*Hepatitis A virus cellular receptor 1*, также известным, как **TIM1** (*T-cell immunoglobulin and mucin domain 1*))
- TIM-1 связывает фосфатидилсерин и таким путем ускоряет проникновение в клетку некоторых оболочечных вирусов (например, вируса Эбола), предполагается, что такой механизм задействован в проникновении квази-оболочечных вирионов ВГА

# Жизненный цикл вируса. Первичная трансляция




Feng Z, et al. 2014.  
Annu. Rev. Virol. 1:539–60

Эндоцитоз квази-оболочечных вирионов и высвобождение вирусного генома




Жизненный цикл ВГА

# Процессинг полипротеина




Расщепление полипептида-предшественника на отдельные структурные и неструктурные белки под действием протеиназы 3С



Морфогенез капсида



# Биогенез eHAV и HAV



Feng Z, et al. 2014.  
Annu. Rev. Virol. 1:539–60

ESCRT- endosomal-sorting complexes required for transport


Собранные ВГА капсиды используют клеточные белки, обеспечивающие транспорт, и отпочковываются:

- от мультивезикулярных образований (оранжевая стрелка)
- от плазматической мембраны (красная стрелка)


eHAV частицы могут утрачивать липидную оболочку и превращаться во внеклеточном пространстве в безоболочечный вирус



# Патогенез



# Репликация вируса гепатита А



коагуляция гепатоцита  
целиком  
(тельца Каунсильмена)

Тельца  
Каунсильмена

а -  
гепатоциты в  
состоянии  
апоптоза.

- Вирус локализуется в цитоплазме гепатоцитов
- Репликация вируса в гепатоцитах приводит к нарушению клеточного метаболизма, усилению перекисного окисления липидов, повышению проницаемости клеточных мембран, повреждению лизосом, нарушению энергетического обмена.
- Вышеперечисленные признаки клеточных изменений являются признаками усиленного апоптоза в гепатоцитах.
- Патогенез многих болезней человека связан с неспособностью клеток подвергаться апоптозу.
- Смерть клетки может играть биологически полезную роль в элиминации тех клеток, выживание которых вредно для организма в целом, например, клеток, пораженных вирусом.
- Как правило, течение гепатита А благоприятное, а организм проводит адекватное уничтожение инфицированных гепатоцитов.

- ❑ Различают типичное и атипичное течение заболевания.
- ❑ При **типичном течении** заболевание развивается циклично с постепенной сменой периодов заболевания.
- ❑ Выделяют четыре периода в течении заболевания:
  - ❑ инкубационный(15-45 дней),
  - ❑ продромальный(5-7 дней),
  - ❑ период разгара(5-20 дней)
  - ❑ период реконвалесценции(4-6 недель).



- ❑ К **атипичным формам** относятся субклиническая, стёртая и безжелтушная.
- ❑ По **степени тяжести** выделяют лёгкую, среднетяжёлую и тяжёлую формы заболевания.
- ❑ По **течению заболевания** различают острую и затяжную
- ❑ у детей до 5 лет (80%) – асимптоматическое. У взрослых клинические признаки наблюдаются у 50-80% инфицированных.
- ❑ Хронизации нет.





## Основными особенностями современного гепатита А являются:

- увеличение среди заболевших удельного веса взрослых, в том числе старших возрастных групп;
- частое сочетание с хронической алкогольной интоксикацией, хроническими гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией;
- наличие холестатического синдрома и аутоиммунного компонента;
- более частое развитие среднетяжелой, тяжелой и фульминантной форм;
- склонность к затяжному течению с обострениями и рецидивами.




- ❑ Антигены вируса вирусного гепатита А проявляют *высокую иммуногенность*:
  - ❑ активация иммунной системы начинается с момента внедрения возбудителя;
  - ❑ антитела появляются в инкубационном периоде
  
- ❑ После перенесенного заболевания формируется *стойкий напряженный пожизненный иммунитет*

# Эпидемиология

- **Антропоноз**
- **Сезонность** – осенний подъем заболеваемости
- **Источник инфекции** – больные острой формой (главным образом, с безжелтушными вариантами болезни)
- Типичная кишечная инфекция с **фекально-оральным механизмом передачи** возбудителя.
- **Пути передачи**: водный, пищевой и бытовой.



# Эпидемиология






# Лечение и профилактика

## Вакцинация

- инактивированные формальдегидом вирусы ВГА
- поствакцинальный период после введения бустерной дозы – более 15 лет


## Пассивная иммунопрофилактика

- Внутримышечное введение иммуноглобулина до заражения вирусом или в раннем инкубационном периоде
- Продолжительность пассивного иммунитета 5-6 месяцев




# Лабораторная диагностика

- Обнаружение вируса (иммунная электронная микроскопия), вирусных антигенов (иммунофлюоресценция, ИФА) или вирусной РНК (обратная ПЦР) в испражнениях (инкубационный и продромальный периоды) и пробах воды
- Определения антител к вирусу



# Лабораторная диагностика

## Вирусные и серологические маркеры заражения вирусом гепатита А



□ Определение ранних антител (**IgM**) в сыворотке больного методом **ИФА** — золотой стандарт диагностики

□ **ОТ-ПЦР** — высокоспецифический ранний метод диагностики





**Благодарю  
за внимание**

