


**Влияние
табакокурения
на эмбрион, плод
и
новорожденного.**



Выполнила: Кривенькая Е.
С. 224 группа

Яйцеклетка



Последствия курения беременной женщины

- Осложнения у матери
- Нарушение развития эмбриона
- Патология плода
- Патология новорожденного

Табачный дым - это не только НИКОТИН

- > Табачный дым содержит свыше 4 000 химических соединений
- > Более чем у 60 из них обнаружено канцерогенное действие
- > Никотин является основным соединением, вызывающим табачную зависимость

Гипоксия плода


- Никотин не канцерогенен, но табачная зависимость вызывает продолжительное воздействие табачного дыма и канцерогенных веществ. Курение во время беременности плодом мужского пола в последующем отражается на репродуктивном здоровье мужчины (количество сперматозоидов снижается до 40%).
- Курение во время беременности плодом мужского пола в последующем отражается на репродуктивном здоровье мужчины (количество сперматозоидов снижается до 40%).
- Для сравнения – взрослый мужчина, который много курит, может иметь снижение количества сперматозоидов лишь на 10%.

Полоний-210



Воздействие на течение беременности

- **Никотин - мощный вазоконстриктор, вызывающий нарушение маточного и маточно-плацентарного кровотока**
- **Повышение частоты нарушений плацентации, отслойки плаценты, кровотечений**
- **Повышение частоты невынашивания беременности**


- 
- Гипоксия плода и как следствие - в 2 раза чаще рождаются дети весом менее 2500г
 - Риск смерти новорожденного выше на 20-35%
 - Риск заболеваний выше
 - Снижение интеллекта - позже начинают говорить, хуже читают и считают
 - Черепно-лицевые аномалии, известные в народе как заячья губа и волчья пасть.

Гипоксия плода

- возникает из-за того, что оксид углерода, проходя беспрепятственно через плаценту, попадает в кровь ребенка, образуя там карбоксигемоглобин



Синдромы заячьей губы и волчьей пасти



Курение во время беременности

- *Риск рождения ребенка с полидактилией*
- 1-10 сигарет: риск возрастает на 29%
- • 11-20 сигарет: риск возрастает на 38%
- • более 21 сигареты: риск возрастает на 78%
- (проанализированы исходы 6,8 млн родов)



Осложнения после рождения





Спасибо за внимание