

ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России

Вопросы приверженности к фармакотерапии при беременности

Покладова М.В. , Загородникова К.А., Бурбелло А.Т.

Санкт-Петербург, 2018г.



Приверженность к фармакотерапии в период беременности

- От 39% до 59,1 % беременных женщин сообщали об отказе от лекарственной терапии
- Сомнения в необходимости применения лекарств
- Боязнь побочных эффектов
- Исчезновение жалоб, по поводу которых назначались ЛС; или жалобы сохранялись, несмотря на проводимую терапию
- Недостаточность информации о лекарственных средствах

(Van Trigt AM, Waardenburg CM. 1994; Olesen C, 2001; Sawicki E, Stewart K, 2011)

Восприятие рисков применения лекарств беременными женщинами

- 69,4% не принимали лекарств из-за неоправданных опасений (Nordeng H et al 2010, EJCP)
- 87% переоценивают риск применения психотропных лекарств (Bonari L. et al. 2005)
- Неадекватное восприятие риска лекарственной терапии беременными влияет на успех фармакотерапии

(Baggley et al 2004; Hancock RL, Koren G, 2007)

Фармакоэпидемиологическое исследование в РФ (Москва, Калуга, Брянск, Смоленск, Орёл, Липецк)

(543 женщины)

Приверженность беременных к рекомендациям

- Не придерживаются рекомендаций врача: **80%**
- Занимаются «самолечением» **56%**

ПЕРВОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ "ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ»

(2324 женщины)

Приверженность беременных к рекомендациям

- Не придерживаются рекомендаций врача: **28,7%**
- Занимаются «самолечением» **17,9%**

Приверженность беременных к фармакотерапии (2324 женщины) :

При назначении:

5 ЛС режим применения нарушался в **14%** случаев

- От 5 до 8 то не придерживались назначенной терапии **26,8%** женщин,
- От 8 и более препаратов, не придерживались терапии до **50%**.

Назначенные ЛС не принимала:

- с высшим образованием каждая 4 женщина
- со средним каждая 10 женщина.

Зависимости от возраста женщины, срока беременности не выявлено.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.

- 623 беременные женщины
- Прием хотя бы 1 растительного препарата в течение всей жизни был у **63,5% женщин**
- **43,8% беременных женщин** применяли как минимум 1 фитопрепарат в период беременности.

Домохозяйки и женщины с низким доходом семьи

Курение

Хронические заболевания в анамнезе

Был предшествующий опыт фитотерапии

Применение сопутствующей фармакотерапии.

- Зависимости от возраста, образования, семейного положения выявлено не было.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

ГЛАВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ВОСТОЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИМЕНЕМ П.А. СТОЛЕТНИКОВА

«Применение лекарств при беременности. Акцент на отношении к терапии, восприятию рисков и психологическом состоянии женщин»

(European Network of Teratology Information Services)



European
Network
Teratology
Information
Services


«Применение лекарств при беременности. Акцент на отношении к терапии, восприятию рисков и психологическом состоянии женщин», данные опроса, проводимого в Российской Федерации

- 1025 участниц опроса в РФ, средний возраст $27,7 \pm 4,8$
- 96% принимали ЛС
- 60,3% принимали растительные ЛС
- 20,7% принимали гомеопатические средства


«Применение лекарств при беременности. Акцент на отношении к терапии, восприятию рисков и психологическом состоянии женщин», данные опроса, проводимого в Российской Федерации (1025 участниц опроса в РФ)

- **55% (546 женщин)** сознательно отказывались от приема безрецептурных лекарственных препаратов
- **45,8 % (469 женщин)** отказывались от приема ЛС, прописанных врачом



Причины отказа от лекарств, рекомендованных врачом (469 женщин)



Причины отказа от безрецептурных ЛС (546 женщин)




Потребность в информации о ЛС




31,8% опрошенных (232 женщины) получили противоречивую информацию о безопасности ЛС, по этой причине отказались от фармакотерапии 93 женщины

Потребность в информации о ЛС

Наличие хронических заболеваний




Помощь в прочтении информационных материалов (при посещении больницы)




Потребность в информации о ЛС


Не могли получить информацию о состоянии здоровья, потому что не могли понять что написал врач



Источники информации для принятия решений




Источники, информацию от которых игнорировали при принятии решения о применении ЛС



Не смотря на то, что я болею, и могла бы принимать лекарства, но для моего ребенка лучше, если я не буду их принимать

60,5%
(620 человек)



Дополнительно сообщили 304 женщины:



Благодарю за внимание!

mariapokladova@gmail.com

+7-931-540-6231

www.babyrisk.ru

