




 Эффективная медицина



Клиника "Ваше здоровье"

**Заболевания
Желез Внутренней Секреции**





Методы диагностики


- Анализ крови (из вены, пальца) мочи.
- Симптомы.

**Эндокринология – наука, изучающая ЖВС
(эндо - внутри , крино - выделяю, логос – учение)**

Поджелудочная железа

- гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы в крови, и глюкагон, обладающий обратным эффектом.
- недостаток вызывает сахарный диабет, при котором глюкоза начинает выводиться с мочой.

Островки Лангерганса



Две
киш



Сахарный диабет



- **охватывает 3% населения земного шара более 50 млн**
- **3-е место по смертности (6%) после сердечно-сосудистых (51%) и онкологических (17%) заболеваний**
- **Ежегодно число больных сахарным диабетом возрастает на 5-10%**



Изучение сахарного диабета

- 1889 г. Меринг и Минковский вызвали у животных сахарный диабет, удалив поджелудочную железу
- 1921 г. исследователи Бантинг и Бест получили из ткани поджелудочной железы инсулин, который у собаки с сахарным диабетом устранял признаки болезни
- 1922 г. инсулин впервые был с успехом использован для лечения больных сахарным диабетом

Сахарный диабет

I типа — инсулинозависимый

- встречается у людей обоего пола
- развивается в детском и подростковом возрасте
- в раннем возрасте заболевание протекает тяжелее, чем в возрасте 40 лет и старше



Сахарный диабет

II типа -

ИНСУЛИНОНЕЗАВИСИМЫЙ

- встречается в 4 раза чаще, чем сахарный диабет I типа, как правило, у людей старше 50 лет и чаще у женщин.

Причины сахарного диабета

- **Наследственная предрасположенность**
- **Ожирение** - бороться с избыточным весом
- **Болезни поджелудочной железы** — панкреатит, рак поджелудочной железы, заболевания других желез внутренней секреции
- **Вирусные инфекции** - краснуха, ветряная оспа, эпидемический гепатит, грипп - играют роль пускового механизма для людей группы риска
- **Нервный стресс** - следует избегать нервного и эмоционального перенапряжения
- **Возраст** - при увеличении возраста на каждые десять лет вероятность заболевания диабетом повышается в два раза



Признаки сахарного диабета

- **повышение уровня сахара крови натощак более 120 мг % (6,6 ммоль/л)**
- **сахар в моче (гликозурия)**
- **увеличение количества мочи, частое мочеиспускание, повышенная жажда, быстрая потеря веса (или ожирение), высокий уровень сахара в крови, ощущение слабости или усталости, ощущение тяжести в ногах**

Признаки сахарного диабета



- **кожный зуд**
- **неясность зрения (“белая пелена” перед глазами)**
- **головокружения**
- **судороги икроножных мышц**
- **плохое состояние кожи: склонность к грибковым заболеваниям, гнойничковым высыпаниям, медленное заживление ран**

Лечение

Сахарная болезнь, сахарное мочеизнурение

- инъекции инсулина
- соблюдение диеты
- поддержании нормальной массы тела на протяжении всей жизни
- при сахарном диабете II типа: сахароснижающие препараты: сульфаниламиды, производные бензойной кислоты
- Сахарозаменители: ксилит, сорбит, сахарин, фруктозу, аспартам

Осложнения Сахарного диабета

- При сильном увеличении количества глюкозы в крови может наступить потеря сознания – **диабетическая кома**
- При избытке инсулина количество глюкозы в крови катастрофически уменьшается и наступает **гипогликемический шок**

Ответы

1. железы
внутренней
секреции

Гипофиз

Эпифиз

Щитовидная

Надпочечники

2. железы
смешанной
секреции

Поджелудочная

Половые

Щитовидная железа

- и четыре паращитовидные железы регулируют уровень и в крови. Щитовидная железа весит около 25 г и находится в области шеи; паращитовидные железы погружены в ткань щитовидной железы.



Щитовидная железа

- выделяет в кровь тиреоидные гормоны, оказывающие большое влияние на многие метаболические процессы (в том числе обмен белков, жиров и углеводов).
- Недостаток тиреоидных гормонов в детстве приводит к задержке физического и умственного развития. Повышенная активность железы приводит к увеличению её размеров и образованию зоба.

Базедова болезнь

Причины:

- Психотравмы, гормональные нарушения, связанные с абортами
- Чаще болеют женщины 20-40 лет



**ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ
ТОКСИЧЕСКИЙ**

повышенная функция
щитовидной железы,
избыточно выделяется
тироксин

Симптомы базедовой болезни

- пучеглазие, раздражительность
- слабость, похудение, быстрая утомляемость
- смена настроения
- выпадение волос, жажда, повышенный аппетит
- дрожание рук (тремор)
- усиленное сердцебиение
- плохой сон, зоб, тахикардия

Лечение базедовой болезни

- **успокаивающие и йодные препараты**
- **при отсутствии эффекта - удаление щитовидной железы оперативным путем**
- **Показание к операции будет переход в рак, сдавливание трахеи**

Микседема (слизистый отек)

от греч. *muxa* — слизь
oïdema — опухание, отек

Причины:

- врожденная или приобретенная атрофия щитовидной железы (после оперативного удаления щитовидной железы)



Микседема (слизистый отек)



Симптомы:

- **отечность кожи и подкожной клетчатки, выпадение волос, вялость,**
- **снижение умственных способностей, понижение обмена веществ,**
- **нарушение функции нервной системы (коры больших полушарий)**

Кретинизм

от франц. cretin — слабоумный, кретин

Причины:

- недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз)

Симптомы:

- задержка физического и психического развития, главным образом в горных районах с недостатком йода в воде или как наследственная патология

Бронзовая (Аддисонова) болезнь

Симптомы:

- резкое потемнение кожи,
 - прогрессирующая мышечная слабость, падение кровяного давления,
 - уменьшение содержания сахара в крови,
 - истощение.
- Название дано по имени описавшего ее в 1849-55 г.г. английского врача Т. Аддисона

Причины: недостаточность функции коры надпочечников (туберкулез, опухоль)

Надпочечники



- парные железы, прилегающие к верхушкам почек; 5 г
- кора и мозговая сердцевина внутри
- гормон - адреналин (усиление сердечной активности, сужение капилляров, повышение уровня глюкозы в крови и кровяного давления, снижение пороговой реакции органов чувств)
- стероидные гормоны, стимулируют расщепление белков, синтез глюкозы и гликогена, подавляют аллергические реакции, регулируют уровень Na^+ и K^+ .
- Активность надпочечников регулируется нервной системой

НАНИЗМ (карликовость)

от греч. nanos — карлик
низкий рост человека: для
мужчин ниже 125 см, для
женщин ниже 120 см

Причины:

- обусловлен поражением желез внутренней секреции: гипофиза, щитовидной и половых желез



Гигантизм

- аномальный рост человека или животного, превышающий рост характерный для вида

Причины:

- обусловлен поражением желез внутренней секреции: гипофиза, щитовидной и половых желез
- При частичном гигантизме увеличены пальцы, кисти, стопы, череп

(Акромегалия).



Акромегалия



от греч. акрон —
конечность и megas —
большой

Причины: избыточная продукция гормона роста, при аденоме гипофиза. Реже поражение гипоталамуса (опухоли, воспалительные процессы, травмы, инфекционное и сифилитическое поражение промежуточного мозга)

Возникает после завершения роста в возрасте 20 -40 лет

Акромегалия



Симптомы: увеличение конечностей, нижней челюсти, надбровных дуг, скул, носа, губ, ушей

Язык увеличен, с трудом уместается во рту.
Голос грубый.

Тетания

от греч. tetanos —
оцепенение, судорога

Симптомы: судорожные припадки, расстройства нервной системы, связанные с низким содержанием кальция в крови вследствие нарушения функции паращитовидных желез, частой и обильной рвотой и поносом.



Феминизация

от лат. femina — женщина

■ Симптомы:

развитие у мужского пола женских вторичных половых признаков: появление у петухов оперения, свойственного курам.

Связана с нарушением деятельности половых желез

Маскулинизация

от лат. *masculinus* — мужской

Симптомы: появление у женского пола мужских вторичных половых признаков: петушиного гребня у кур.

Связана с нарушением деятельности половых желез
Может быть вызвана экспериментально