



ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИН І ВАГІТНІСТЬ.

Підготував
студент 3-фб групи
Шатрюк Олександр

Варикозна хвороба

- ▣ Зустрічається досить часто (15-20%), переважно у жінок, які народжують багато разів.
 - Причиною виникнення цієї патології є зниження тону мускулатури венозної стінки та недосконалість венозної клапанної системи.



Варикозна хвороба

Причина:

- Зниження рівня естрогенів та збільшенням прогестерону, який має розслаблюючу дію на стінки вен.
- Збільшення об'єму циркулюючої крові.
- Підвищення венозного тиску.
- Сповільнення кровотоку в нижніх кінцівках.
- Тривале стояння на ногах.
- Тяжка фізична праця.

Варикозна хвороба

Лікувальні заходи:

- ▣ Вагітній рекомендують носити еластичні панчохи, кілька разів на день лежати з дещо піднятими ногами.
- ▣ Змащувати кінцівки венозним гелем.
- ▣ Перед пологами еластичне бинтування нижніх кінцівок.
- ▣ Післяпологовому періоді раннє вставання.
- ▣ Дезагрегантна та антикоагулянта терапія.

Варикозна хвороба

Ведення вагітності та пологів:

- Наявність варикозної хвороби нижніх кінцівок не є протипоказанням до доношування вагітності.
- Щодо ускладнень вагітності, то у жінок з аномаліями прикріплення плаценти варикозна хвороба виникає частіше.
- В пологах може виникати слабкість пологової діяльності, частіше зустрічаються кровотечі в послідовому та ранньому післяпологовому періодах.

Варикозна хвороба

Ведення пологів:

- При підвищеній гемокоагуляції в пологах можна ввести 5000 ОД гепарину за 2-4 год до завершення пологів чи за 2 год до кесаревого розтину.
- Можна використовувати низькомолекулярні аналоги гепарину — фраксипарин, клексан, які сповільнюють згортання крові на більш ранніх стадіях.
- Дезагрегантну терапію здійснюють введенням тренталу, реополіглюкіну.

A close-up photograph of a woman with long dark hair, her eyes closed and a pained expression on her face. She is holding her hands to her head, suggesting a headache or stress. The background is a warm, out-of-focus yellow and orange. A semi-transparent green rectangular box is centered over the image, containing the title text in a dark blue, serif font.

ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ВАГІТНІСТЬ

Епілепсія

Диференційна діагностика з еклампсією:

- При епілепсії немає підвищення АТ
- Нормальні аналізи сечі
- Епілептична аура, «епілептичний крик» перед нападом судом.
- Епілепсія погіршує перебіг гестозів.

Хворих на епілепсію обов'язково необхідно госпіталізувати і проводити індивідуально підібране регулярне лікування, що дасть можливість задовільно компенсувати захворювання

Епілепсія

Перебіг вагітності

- Характеризується більш частим її перериванням. (Вагітність переривають за бажанням жінки.)
- Протисудомну терапію продовжують і в пологах
- Пологи ведуть через природні пологові шляхи, вони ж, як правило, перебігають швидко.
- Якщо виникає епілептичний статус, а завершити пологи природними пологовими шляхами немає можливості, вдаються до кесаревого розтину.

Серед інших захворювань, що можуть зустрічатися у вагітних — розсіяний склероз, міопатія, міастенія

- ❑ **Розсіяний склероз** при вагітності з'являється рідко. Діагностика затруднена. Перші ознаки можуть проявитися під час вагітності або після пологів. Вагітність, як і її переривання, впливає на перебіг захворювання негативно, тому необхідно настирливо пропагувати таким хворим контрацепцію.
- ❑ **Міопатія.** Захворювання характеризується поступовою атрофією м'язів. Діяльність гладкої мускулатури не порушується. Хвороба має спадковий характер. Вагітність протипоказана при всіх формах міопатії.

Міастенія

- Трапляється рідко
- Підвищена м'язова втомлюваність.
- Під час вагітності симптоми зменшуються.
- Після пологів може наступити різке погіршення.
- Вагітність під ретельним наглядом гінеколога та невропатолога.

Пологи ведуть через природні пологові шляхи в присутності анестезіолога, тому що може виникнути необхідність інтубації і ШВЛ

Дякую за увагу!!!

