

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина  
университеті

## Резиденттің өзіндік жұмысы.

Такырыбы: **Заманауи технологияларды қолдану арқылы  
жүрек ырғағының бұзылысын қалпына келтіру.**

A.

Орындаған: Курмангалиева

Маңыздылығы: Жүректің ритм бұзылсысымен әлемде арбір екі жүзінші адам ауруда. Ритм бұзылсы ИМ және инсульт және т.б өмірге аса қауіпті аурулардың даму қаупін жоғарылатады.

- *Мақсаты:* кардиовентра – дефибрилятор маңыздылығын ашып қарастыру.

**Сұрақ:** Жүрек ырғағының бұзылуына байланысты МИ бастан кешкен науқастарға кардиовентра – дефибрилятор + ААД қолданған кейін МИ туындауы мүмкін бе?

- Р – ИМ бастан кешкен 60 жастан асқан науқастар.
- I – кардиовентра – дефибрилятор + ААП
- С – ААП
- О – Өмір көрсеткіштерінің жақсаруы.

# Зерттеу дизайны:

Клиникалық зерттеу

Экспериментальные

Контролируемые

Рандомизерленген

Ашық зерттеулер

# Генеральная совокупность – ИМ бастан кешкен 60 жастан асқан науқастар

Тандау: ыңғайлы (удобная).

Ыңғайлы себебі: элементтер информация жинау жері және уақытына сай ыңғайлы табылды. Кардиоцентрде жатқан 12 науқас бақыланды.

Тапсырма.

1. 60 жастан асқан ИМ бастан кешкен науқастарды алу.

1 – ші топқа ААП + КВД

2 – ші топқа ААП.

2. Қосу критерилері:

- Сол жақ қарынша айдау фракциясы <35% болған,
- ИМ бастан кешкен науқастар
- NYHA бойынша жүрек жетіспеушілігі 2-3 кластары

3. Лабораториялық зерттеулер: ЖҚА,БҚА (АЛТ,АСТ,натрий калий, мочевина, креатини), коагулограмма

4. Инструментальды зерттеу: ЭКГ 12- тіркеу нұктесімен, СМАК

# Этикалық аспектілер:

- Автономдылық: ақпараттық келісім, қатысудан бас тарту құқығы, шешімді қабылдаудағы үшінші тұлғаның араласуы;
- Қауіп төндірмеу (primum non nocere);
- Сыйластық : ақпараттық келісім ;
- Шынайылық: ақпараттың екі тілде бірдей жазылуы, ақпараттық келісім, қажетті ақпаратты толық ашу, адекватты және түсінікті құрылым;
- Қайырымдылық: пайда қауіптен жоғары болуы;
- Әділеттілік: қауіптің пайдадан көп болмауы болуы.

# Chronic total occlusion of an infarct-related artery: a new predictor of ventricular arrhythmias in primary prevention implantable cardioverter defibrillator patients.

- AIMS:

The aim of this article is to evaluate the impact of a coronary chronic total occlusion in an infarct-related artery (IRA-CTO) on the occurrence of ventricular arrhythmias (VAs) in patients implanted with an implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention.

- METHODS AND RESULTS:

The study includes a prospective cohort of 108 consecutive patients with ischaemic cardiomyopathy, in whom an ICD was implanted for primary prevention and a coronary angiography performed before ICD implantation. About 49 patients (45%) had a CTO and 34 (31%) had an IRA-CTO. Patients with IRA-CTO did not differ from the rest of the population in terms of basal characteristics and severity of cardiac disease. Median follow-up was 33 months (interquartile range 46). Infarct-related artery-CTO was associated with higher rates of any VA (53 vs. 26%,  $P = 0.006$ ) and fast ventricular tachycardia (fast VT, cycle length <300 ms) or ventricular fibrillation (VF) (47 vs. 19%,  $P = 0.002$ ). At multivariate Cox regression, IRA-CTO was the only independent predictor of any VA [hazard ratio (HR) 3.64,  $P = 0.002$ ] and fast VT/VF (HR 3.36,  $P = 0.008$ ). On the contrary, CTO not associated with a prior infarction in their territory did not increase the risk of VA. Infarct-related artery-CTO was also an independent predictor of cardiac mortality or heart transplantation (HR 3.46,  $P = 0.022$ ).

- CONCLUSION:
- In ischaemic patients implanted with an ICD for primary prevention, a CTO associated with a previous infarction in its territory is an independent predictor of VA and, especially, of fast VT/VF, identifying a subgroup of patients with a very high rate of arrhythmic events at follow-up

# Мақсаты:

- инфаркт - тәуелді артерияның корнарлы созылмалы толықтай окклюзиясының қарыншалық аритмияға әсерін бағалау.

# СұраІ:

Инфаркт - тәуелді артерияның корнарлы созылмалы толықтай окклюзиясы бар ИКВД(имплантациялы кардиоветро - дефибрилятор) – ды алғашқы ем рентінде қолданатын науқастардағы ҚА (қарыншалық аритмия) – ның кездесу жиілігін анықтау?

P – ИКВД – мен ИМ бастан кешкен 108 науқас

I – созылмалы толықтай окклюзиясы бар инфаркт тәуелді артерясы бар 39 науқас

C – Инфаркт – тәуелді артериясы бар 49 науқас

O – кездесу жиілігі жоғары.

T – 33 апта

- Зерттеу дизайны : проспективті когортты
- Зерттеу таңдауы: ыңғайлыш.

Назар аударғандарыңызға  
Рахмет!