

Болота Угличского края

Автор: Соловьева Эльвира

8 класс, МОУ СОШ №6

**Руководитель: Шуникова Виктория
Андреевна, педагог-организатор МОУ
СОШ №6**


Углич

2018

Карта-схема болотных районов Ярославской области

- № 48 – Кайловское болото
- № 49 – Кобузинское болото
- № 50 – Скоморошино болотое
- № 51 – Черное болото

Углич



Кобузинское болото

- **Охраняемый болотный массив в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области**
- **Памятник природы.**

Скоморошино болото

- **Охраняемый болотный массив в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области**

- **Памятники природы**


Черное болото

- Болотный массив, рекомендуемый к охране.
- Он представляет большой научный и практический интерес.

Подробнее остановимся на болоте Кайловское



Место расположения на карте



Кайловское болото

- Государственный природный (ландшафтный) заказник в Угличском районе Ярославской области. Расположен на расстоянии *13* км на юг от г. Углич. Площадь болота — *1259* га. Представляет собой уникальный болотный массив не затронутый фрезерными торфоразработками, гидрографический узел на водоразделе рек Улеймы и Жабни, местообитание флоры и фауны. Состоит на учете международного проекта по охране болот ТЕЛМА. Болото проточных котловин, находящееся на олиготрофной фазе развития
- Торфяные болота в этом районе распространены довольно широко. Значение в круговороте природных вод: поддержание гидрологического режима в бассейне Волги. Большие запасы пресной воды в торфяной запежи. Очистка

ФАУНА

- На болоте Кайловское встречены следующие животные, включенные в Красную книгу Ярославской области (2004): из птиц — белокрылая крачка, беркут, болотная сова, большой веретенник, б. кроншнеп, б. крохаль, б. подорлик, дупель, европейская чернозобая гагара, луговой лунь, малая выпь, м. крачка, МОХНОНОГИЙ СЫЧ, овсянка-ремез, пискулька, полевой лунь сапсан, серая утка, серебристая чайка, серый гусь, с. журавль; из млекопитающих —



ФЛОРА

- На болоте Кайловское выявлено 90 видов сосудистых растений. Из них в Красную книгу Ярославской области (2004) включены — береза карликовая, ива черничная, клюква мелкоплодная, пальчатокоренник мясокрасный, п. пятнистый, п. Траунштейнера. В пределах болотного массива Кайловское выделены древесный,



В настоящее время болото Кайловское, в соответствии с ландшафтной классификацией Е. А. Галкиной (1959), по конфигурации массива, распределению растительного покрова, характеру строения торфяной залежи можно рассматривать как типичную болотную систему класса проточных котловин, вступившую в олиготрофную фазу развития. Оно сформировалось на территории области в болотном районе моренной равнины (плато).

СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Болото используется для сбора клюквы, морошки, черники, смородины, лекарственного сырья, как охотничье угодье. Место научных