



# Тесты по медицинской подготовке. ( часть 2)

**Вариант 1**

**Вариант 2**

# Результат теста

Время: 1 мин. 37 сек.

[исправить](#)

[ещё](#)

# Вариант 1



1. Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударах?

**а) Как можно быстрее перенести пострадавшего в тень, уложить на спину, (голова должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца.**

**б) Поместить пострадавшего в тень или прохладное помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха.**

**в) Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить холодный компресс на грудь.**

# Вариант 1



2. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении мозга.

**а) Уложить пострадавшего на спину, положить под голову валик и дать тёплое питьё.**

**б) Уложить пострадавшего на бок или спину со склонённой на бок головой и транспортировать в таком положении в лечебное учреждение.**

**в) Положить пострадавшего на спину или в положение полулёжа со склоненной на бок головой.**

# Вариант 1



3. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти?

**а) В положении лёжа.**

**б) В положении сидя.**

# Вариант 1



4. Пострадавший находится без сознания. Дыхание , пульс отсутствуют. Ваши действия?

**а) Позвонить « 112» и ждать прибытия скорой помощи.**

**б) Позвонить «112», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.**

**в) Положить пострадавшего в благоприятную позу, сделать перевязку, дать обезболивающее средство.**

# Вариант 1



5. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен находиться в положении:

**а) Пострадавший должен быть уложен на жёсткий щит, в положении на животе( с валиком под верхнюю часть туловища) или на спине( с валиком в поясничном отделе).**

**б) Пострадавший должен быть уложен на жёсткий щит, в положении на животе с приподнятым головным концом.**

**в) Пострадавший должен быть уложен на жёсткий щит с опущенным головным концом.**

# Вариант 1



6. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака ( нашатырный спирт)?

**а) Для обработки ран.**

**б) Для наложения согревающего компресса.**

**в) Для вдыхания при обмороке и угаре.**



# Вариант 1



7. Прекордиальный удар наносят:

**а) По левой стороне грудной клетки, рядом с грудиной.**

**б) В область нижней трети грудины на 2-4 см выше мечевидного отростка.**

**в) По мечевидному отростку грудины.**

# Вариант 1



8. Как оказать помощь при проникающем ранении грудной клетки?

**а) Наложить повязку, уложить раненного на живот, транспортировать в больницу.**

**б) На место ранения приложить грелку( пузырь) со льдом.**

**в) Закрывать рану липким пластырем или воздухонепроницаемым материалом и наложить тугую повязку.**

# Вариант 1



9. Комплекс сердечно – лёгочной реанимации включает в себя:

**а) Прекордиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.**

**б) Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками.**

**в) Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильной повязки, наложение шин.**

# Вариант 1



10. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца?

**а) Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.**

**б) Дать понюхать нашатырного спирта.**

**в) Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды.**

# Вариант 1



11. Как оказать помощь пассажиру, если у него поднялась температура выше  $39^{\circ}\text{C}$ ?

**а) Уложить больного, дать 15 капель корвалола в 50 мл воды.**

**б) Уложить больного, к голове приложить охлаждающий пакет – контейнер, дать таблетку аспирина.**

# Вариант 1



12. В каких случаях применяется энтеродез или активированный уголь, находящийся в автомобильной аптечке?

**а) При высокой температуре.**

**б) При болях в животе.**

**в) При отравлениях.**

# Вариант 1



13. Для чего применяется раствор сульфацила натрия находящийся в автомобильной аптечке?

**а) Для промывания ран.**

**б) Смочит салфетку и приложить для стерилизации обожжённой поверхности.**

**в) при травме глаза или попадании инородных тел промыть глаза водой и закапать 3 – 5 капель сульфацила натрия.**

# Вариант 1



14. Признаки отравления угарным газом?

**а) Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожного покрова.**

**б) Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов.**

**в) Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе.**



# Вариант 1



15. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока?

**а) Положить пострадавшего на спину, под голову положить валик из одежды, дать понюхать нашатырный спирт.**

**б) Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть верхнюю одежду, дать понюхать нашатырный спирт.**

# Вариант 1



16. Как оказать помощь при ожоге кипятком?

**а) Смазать обожжённый участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку.**

**б) Промыть обожжённые участки водой 30 мин, наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства.**

**в) Обожжённую поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку.**

# Вариант 1



17. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя?

**а) Внимание снижается, реакция не меняется.**

**б) Реакция снижается, внимание усиливается.**

**в) Внимание и реакция снижаются.**

# Вариант 1



18. Как правильно оказать помощь пострадавшему с переломом плечевой кости?

**а) Подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство.**

**б) Прибинтовать руку к туловищу.**

**в) В подмышечную область положить валик, согнуть руку в локтевом суставе, наложить шину от здорового наплечного сустава до кончиков пальцев, дать обезболивающее средство.**

# Вариант 1



19. Как начинать бытование грудной клетки при её ранении?

**а) На выдохе с нижних отделов грудной клетки.**

**б) На вдохе с середины грудной клетки.**

**в) На выдохе от подмышечных ямок.**

# Вариант 1



20. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?

**а) От кончиков пальцев до локтевого сустава.**

**б) От кончика пальцев до верхней трети плеча.**

**в) От лучезапястного сустава до верхней трети плеча.**

# Вариант 2



1. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях пострадавшего надо:

**а) Пострадавшего посадить.**

**б) Уложить пострадавшего, конечность приподнять.**

**в) Пострадавшего поставить на ноги.**

# Вариант 2



2. Для чего используется травматическая повязка МАГ с диоксидином, находящаяся в автомобильной аптечке?

а) Для остановки кровотечения.

б) Для промывания загрязнённых ран.

в) Для уменьшения боли при переломах.



# Вариант 2



3. Как оказать помощь при ожогах I степени?

**а) Вскрыть пузырь, положить мазевую повязку.**

**б) Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.**

**в) Охладить обожжённую поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную ватно – марлевую повязку.**

# Вариант 2



4. Как оказать помощь пострадавшему при переломе ключицы?

**а) Наложить две шины на плечо.**

**б) Прибинтовать руку к груди.**

**в) Наложить марлевую повязку Дезо.**

# Вариант 2



5. Какое средство из автомобильной аптечки нужно применять при стрессовой реакции?

**а) Развести в 50 мл воды 30 капель ковалолола и дать выпить больному.**

**б) Дать больному под язык таблетку валидола.**

**в) Дать больному таблетку анальгина.**

# Вариант 2



6. Где надо проверять пульс, если пострадавший без сознания?

**а) На лучевой артерии.**

**б) На бедренной артерии.**

**в) На сонной артерии.**

# Вариант 2



7. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе?

**а) Наложить асептическую повязку на рану.**

**б) На рану наложить стерильную салфетку, накрыть её воздухонепроницаемым материалом и забинтовать.**

**в) Наложить тугую повязку.**

# Вариант 2



8. Какие средства из автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при переломе?

**а) Валидол.**

**б) Анальгин и охлаждающий пакет – контейнер.**

**в) Энтеродез.**

# Вариант 2



9. Какие признаки клинической смерти?

**а) Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии, широкие зрачки.**

**б) Отсутствие сознания, судороги, выделение пены изо рта.**

# Вариант 2



10. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?

**а) Нет.**

**б) Можно.**

**в) Только маленькими глотками.**



# Вариант 2



11. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении?

**а) Бинт.**

**б) Верёвку.**

**в) Закрутку из полосы материи.**

# Вариант 2



12. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа?

**а) Уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенными вокруг неё валиками из одежды.**

**б) Уложить пострадавшего на спину, дать тёплое питье, на голову положить компресс.**

**в) Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик.**

# Вариант 2



13. Какая повязка накладывается на бедро?

**а) От коленного сустава до подмышечной впадины.**

**б) ) Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины , вторая – от стопы до места перелома.**

**в) Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторая от стопы до паха.**

# Вариант 2



14. Каковы признаки вывиха в суставе?

**а) Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, отсутствие движений в суставе.**

**б) Бол, припухлость, патологическая подвижность.**

**в) Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура.**

# Вариант 2



15. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?

**а) Обложить голень валиками из одежды.**

**б) Прибинтовать к здоровой ноге.**

**в) Туго забинтовать.**

# Вариант 2



16. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами грудины и рёбер?

**а) Лёжа на боку.**

**б) Лёжа на спине.**

**в) Полусидя.**

# Вариант 2



17. Для чего нужна S – образная трубка в автомобильной аптечке?

**а) Для фиксации нижней челюсти при переломе.**

**б) Чтобы напоить пострадавшего.**

**в) Для проведения сердечно – лёгочной реанимации.**

# Вариант 2



18. Укажите правильный ритм проведения реанимации, если в оказании помощи участвуют 2 человека?

**а) Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину.**

**б) Два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину.**

**в) Три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину.**



# Вариант 2



19. Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки?

**а) Наложить шину.**

**б) Тугая повязка.**

**в) Подвесить руку на косынку.**

# Вариант 2



20. Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизующей шины?

а) Да.

б) Нет.

## Ключи к тесту:

1 вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отв.	б	б	б	б	а	в	б	в	а	в	б	в	в	а	б	б	в	в	а	б

2 вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отв.	б	б	в	в	а	в	б	б	а	а	в	а	в	а	б	в	в	а	в	б

Литература: Методическое пособие : « Вопросы экзамена по медицинской подготовке».