

Пролежни и их профилактика.

Выполнил: студент 115 группы,
Львов Павел.

Преподаватель: Власенко Анна
Борисовна.

ПРОЛЕЖНИ:

Пролежни - это участки ишемии (обескровливания) и некроза (омертвления) тканей, возникающие в результате длительного давления, сдвига или смещения их между скелетом человека и поверхностью постели.

Факторы риска возникновения пролежней:

- сниженное питание и недостаток питья;
 - избыточный вес и истощение;
- сердечно-сосудистые заболевания;
 - сахарный диабет;
- недержание мочи и кала;
 - травмы и заболевания спинного и головного мозга;
- потоотделение при повышенной температуре;
 - грязная кожа;
- крошки и мелкие предметы в постели;
 - складки, швы, пуговицы на белье;
 - аллергическая реакция на средства по уходу за кожей.

МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

Потенциальными местами образования пролежней могут быть все места над костными выступами на теле, которые сдавливаются при лежании или сидении.

В этих местах слабее всего выражена подкожно-жировая клетчатка, давление костных выступов выражено сильнее всего.

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЕДРЕ:



ПРОЛЕЖНИ НА БОЛЬШИХ ВЕРТЕЛАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ



НА ВИСОЧНОЙ КОСТИ





ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖИВОТЕ





ПРОЛЕЖНИ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ОТ ГИПСОВОЙ ПОДВЯЗКИ



І СТАДИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

Образуется стойкая гиперемия кожи,
не проходящая при перемещении пациента





Лечение I стадии- консервативное

Используются мази , повязки



II стадия пролежней

Образование пузыря,
заполненного межтканевой жидкостью



Лечение II стадии- консервативное

Использование повязок, кругов, матрасов




III стадия пролежней

Пузырь лопается, образуя язву с неровными краями, с зияющим дном.


Поражается подкожно- жировая клетчатка и мышечная ткань.

Рана издает зловонный запах




C. Due to the pre-existing tissue damage, the newly expanded damage zone spreads out well beyond the original pressure point, when pressure is reapplied.

Stage 3




IV стадия пролежней

Поражается подкожно- жировая клетчатка,
мышечная ткань и костная ткань.
Рана издает зловонный запах



D. Repeated pressure can cause a Grade III ulcer, an open sore and necrosis down to the fascial level. As before, the zone of tissue damage expands far beyond the original pressure point.



Лечение III и IV стадии- хирургическое





ПРОФИЛАКТИКА

-Необходимо часто менять положение тела пациента, чтобы кожа испытывала минимальное трение, а мягкие ткани - минимальное смещение.

Это необходимо делать не реже, чем каждые 2-3 часа, в том числе и в ночное время.

Под места костных выступов дополнительно подкладывают валики, например, мягкие подушки из пера

-Тщательный уход за кожей: не допускайте загрязнения кожи, чрезмерной сухости и влажности

-Питье и питание должны быть полноценными с учетом ограничений, если таковые имеются.

Пища должна содержать не менее 20 % белка

Спасибо за
внимание!!!