

Форма умственной
отсталости:
Олигофрения – понятие,
этимология, систематика

Выполнила студентка
заочного отделения
361 группы
Теплова Е.А.

Основные понятия и определения

Олигофрения (малоумие) - форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения головного мозга в перинатальный и ранний постнатальный периоды.

Олигофрения (или умственная отсталость, малоумие) подразумевает под собой определение группы патологий, отличающихся между собой особенностями этиологии и патогенеза, при которых речь идет врожденных или приобретенных в период раннего детства формах недоразвития психики. Олигофрения, симптомы которой проявляются, прежде всего, в форме поражения разума по причине остановки развития личности на фоне патологического развития головного мозга, помимо этого отражается на волевых и эмоциональных качествах больного, его моторике и речи.

Основные понятия и определения

Термин олигофрения был предложен немецким психиатром Э. Крепелином в начале XX века для обозначения группы аномалий развития, разнородных по этиологии, клинической симптоматике, главной особенностью которых является тотальное психическое недоразвитие.

Изучение специфики умственной отсталости при олигофрении активно велось в 50-70-х гг. XX в. такими отечественными учёными, как Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев и др..

Этиология

Возможные причины:

1. Генетические (по статистике в 50 % случаев);
2. Внутриутробное поражение плода нейротоксическими факторами физической (ионизирующее излучение), химической или инфекционной (цитомегаловирус, сифилис и др.) природы;
3. Значительная недоношенность;
4. Нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма);
5. Травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с поражением центральной нервной системы;
6. Педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из неблагополучных семей.
7. Умственная отсталость неясной этиологии.

Систематика МКБ-9

Согласно международной классификации болезней, травм и причин смерти девятого пересмотра (МКБ-9) выделяют 3 степени олигофрении:

1. Дебильность;
2. Имбецильность;
3. Идиотия.

Дебильность - легкая степень олигофрении (IQ 50-70). К этой категории относится 70-80 % от общего количества лиц с интеллектуальной недостаточностью. Дети с незначительной умственной отсталостью после обследования ПМПК направляются в специальную (коррекционную) школу VIII вида, специальные классы общеобразовательной школы.

Систематика МКБ-9

Имбецильность - средняя степень олигофрении. Больные могут говорить, понимать жесты и обращённую к ним речь. Имбецилам могут быть привиты элементарные навыки. Понятие «имбецильность» в специальной педагогике в настоящее время используется реже, чем понятие «умеренная умственная отсталость» (IQ 35-49).

Идиотия - наиболее глубокая степень олигофрении. В выраженных случаях инстинкты, примитивные реакции полностью отсутствуют. Речь не развита, больные могут издавать нечленораздельные звуки. Способность ходить появляется поздно, движения неуклюжи, малокоординированные, часто наблюдаются стереотипные покачивания, сгибания туловища, повороты головы и др. В одних случаях преобладает апатия, вялость, в других - неадекватный плач, гнев, злобность. Коэффициент интеллекта (IQ) при идиотии варьируется от 0 до 34.

Систематика МКБ-10

Все чаще в рамках нынешнего времени используется классификация МКБ-10 в соответствии с показателями IQ, определяющими степени тяжести олигофрении, что предлагается в следующих вариантах:

1. легкая степень олигофрении - при показателях IQ в пределах 50-70 баллов;
2. умеренная степень олигофрении - при показателях IQ в пределах 35-50 баллов;
3. тяжелая степень олигофрении - при показателях IQ в пределах 20-35 баллов;
4. глубокая степень олигофрении - при показателях IQ не достигающих 20 баллов.

Спасибо за внимание