

Лесные утки — род водоплавающих птиц из семейства утиных. Включает 2 вида — североамериканскую каролинскую утку и азиатскую мандаринку.

Длина: Каролинская утка: 47 – 54 см

Масса: Каролинская утка Каролинская утка: 450 г, Мандаринка: 430 – 690 г





Оба эти вида часто привлекают к себе внимание — в частности, благодаря яркой и контрастной расцветке самцов. **Каролинская утка** населяет восточную часть Северной Америки населяет восточную часть Северной Америки — главным образом, на территории США населяет восточную часть Северной Америки — главным образом, на территории США, хотя её ареал простирается от южных районов Канады населяет восточную часть Северной Америки — главным образом, на территории США, хотя её ареал простирается от южных районов Канады до северной Мексики населяет восточную часть Северной Америки — главным образом, на территории США, хотя её ареал простирается от южных районов Канады до северной Мексики. Мандаринка распространена



главным образом, на территории США, хотя её ареал простирается от южных районов Канады до северной Мексики. Мандаринка распространена

Каролинская утка длиной 43—51 см, имеет массу 482—879 г. У самцов красные глаза и радужный разноцветный наряд в брачном оперении. У обоих полов на голове развит хохолок. Схожие размеры и у мандаринки — длина 41—51 см, масса 444—500 г. Наряд самца мандаринки ещё более пышный по сравнению с самцом каролинской утки.

Каролинская утка питается мелкими рачками питается мелкими рачками, улитками питается мелкими рачками, улитками, водными и наземными насекомыми питается мелкими рачками, улитками, водными и наземными насекомыми, а также растительными кормами — желудями питается мелкими рачками, улитками, водными и наземными насекомыми, а также растительными кормами — орехами, семенами и вегетативными частями растений. **Мандаринка** преимущественно растительноядна.

Каролинская утка репродуктивна в любое время года. В кладке 9—15 яиц, продолжительность насиживания около 30 дней. Птенцы выводкового типа, покидают гнездо в возрасте около двух месяцев. Средняя продолжительность жизни каролинской утки около 10 лет.



Мандаринка в период брачных игр у самца, помимо пышного наряда, развит рыжий воротник из удлинённых узких перьев, а также оранжевые «паруса», образованные третьестепенными маховыми. Так же, как и американская утка, этот вид гнездится в дупле, куда откладывает 9—12 яиц. Инкубационный период, как и у каролинской утки, около 30 дней, однако сроки выхаживания потомства значительно меньше — около 40—45 дней.

