

Первая помощь при укусах насекомых, пауков и клещей



Укусы насекомых

Укусы насекомых могут вызывать серьезные осложнения для здоровья человека и его жизни, т.к. при укусах в ранку попадает ядовитое вещество, которое вызывает **отравление** организма.



Опасные насекомые

- **Комар обыкновенный.** На человека и животных нападают кровососущие комары. Кровожадны только самки, а самцы питаются нектаром. У самок без кровососания не созревают яйца.
- **Комар малярийный.** Самые опасные животные на нашей планете, переносят возбудителей малярии – малярийных плазмодиев.



Опасные насекомые



Опасные насекомые

- **Овод.** Паразитирование личинок под кожей коров снижает удои молока, на коже пораженных животных остаются поврежденные места, что обесценивает их шкуры.
- **Слепень.** Самые крупные среди кровососущих двукрылых (размеры в среднем 10-20 мм).



Признаки укусов насекомых:

- на коже появляется едва заметная ранка;
- припухлость;
- покраснение;
- зуд на коже;
- повышается температура;
- появляется сыпь по телу;
- головная боль.



Первая помощь при укусах:

- удалить жало пинцетом;
- промыть ранку спиртом или марганцовкой;
- на место укуса наложить холод (лед);
- дать 1-2 таблетки супрастина;
- обильное питьё;
- если состояние продолжает ухудшаться, то надо обратиться к врачу.

Аллергические реакции

Одиночные укусы пчел, ос, шмелей, как правило, не опасны. Тяжелое состояние после укуса может быть связано с повышенной чувствительностью организма. Реакцию организма на укусы насекомых называют аллергической реакцией. Если у человека повышенная чувствительность к укусам, то он должен иметь при себе необходимые лекарственные препараты и соблюдать меры предосторожности.



Укусы пауков

Все виды тарантулов являются ядовитыми. Яд заключается в железах, находящихся в головогруди и открывающихся на верхушке щупалец-жвал, которыми паук прокалывают кожу своей добычи, чтобы затем ее высосать. На человека тарантулы самостоятельно не нападают, но если их дразнить, то в особенности самки, носящие яйцевой кокон или имеющие на себе молодых паучков, подпрыгивают и могут укусить человека.



Укусы пауков

Для человека укушение тарантулом никогда не бывает смертельным, но вызывает опухоль и боль в укушенном месте. Кроме того, иногда кожа делается при этом желтого цвета и остается такой довольно продолжительное время (до 2 месяцев).



Укусы клещей

- Местом обитания лесных клещей обычно бывает смешанный лес с преобладанием лиственных деревьев и молодняка и с наличием на земле густого травяного покрова, а также заросли кустарника.



Укусы клещей

- Укусы клещей можно не заметить: для человека они безболезненны. Однако при укусе клещи вносят в ранку вместе со своей слюной вирус энцефалита.
- Наиболее велика опасность заражения клещевым энцефалитом в конце апреля, мае и июне.



Признаки укуса клеща:

- через 10-15 дней повышается температура, человека лихорадит;
- головные боли;
- тошнота, рвота;
- невозможность движения мышц лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

Первая помощь при укусах:

- на место укуса капнуть масло, керосин, вазелин (клещ начинает задыхаться);
- удалить клеща пинцетом легким покачиванием из стороны в сторону;
- место укуса обработать йодом или спиртом;
- присосавшихся клещей лучше удалять в медпункте.

Нельзя!

- Давить клещей руками. Обнаруженных клещей надо уничтожить, бросив в огонь или в банку с керосином. Чем скорее будет снят присосавшийся клещ, тем меньше опасность заражения энцефалитом.

Как уберечься от укусов:

- отправляясь в лес, защитите себя от заползания клещей под одежду;
- регулярно проводите само- и взаимоосмотры одежды и тела;
- для стоянок выбирайте поляны вдали от кустарников и деревьев;
- после возвращения из леса осмотрите одежду и тело.