

Первая помощь при укусах змей и насекомых


Выполнил
учитель
Столбищенской
СОШ Клопов
Ярослав



Первая помощь при укусе змеи

- Определенные разновидности змей ядовиты. И человек, столкнувшийся с укусом такого животного, никогда не может быть уверен в его безопасности. Стоит отметить, что агрессивное влияние яда может проявиться далеко не сразу, а лишь через час. Поэтому при таком несчастном случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь либо отправиться в больницу. До приезда специалистов следует оказать пострадавшему первую помощь. Определенные разновидности змей ядовиты. И человек, столкнувшийся с укусом такого животного, никогда не может быть уверен в его безопасности. Стоит отметить, что агрессивное влияние яда может проявиться далеко не сразу, а лишь через час. Поэтому при таком несчастном случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь либо отправиться в больницу. До приезда специалистов следует оказать пострадавшему первую помощь.





- Вначале его необходимо обездвигнуть (хотя бы укушенную конечность). Так яд гадюк распространяется вместе с током лимфы, и физическая активность может увеличить скорость его продвижения. Желательно расположить пострадавшего таким образом, чтобы его голова находилась ниже, чем ноги.



После этого необходимо приступить к выдавливанию и отсасыванию яда из ранки. Продолжайте такую процедуру в течение четверти часа. Некоторые специалисты утверждают, что таким образом вы сможете устранить примерно половину яда. Змеиный яд не способен проникнуть в организм через ротовую полость (при отсутствии в ней язв и порезов), однако слюну нужно обязательно сплевывать после каждого отсасывания. Закончив такую манипуляцию, промойте ранку, а также рот водой.



- Во многих современных источниках не рекомендуют проводить отсасывание яда. Современные медики утверждают, что такая мера не особенно эффективна, но может отнять время и усугубить повреждения.



- Во многих современных источниках не рекомендуют проводить отсасывание яда. Современные медики утверждают, что такая мера не особенно эффективна, но может отнять время и усугубить повреждения.



- Для снижения концентрации яда рекомендуется давать пострадавшему побольше жидкости – воды, чая и пр. Если скорая долго не приезжает, а состояние человека ухудшается, введите ему какой-то противовоспалительный или антигистаминный препарат. С этой целью может использоваться преднизолон, супрастин либо димедрол. Для устранения болезненных ощущений стоит дать больному анальгетики.



- Разрезать, прижигать ранки и обкалывать пораженное место лекарствами ни в коем случае не стоит. Также нельзя давать пострадавшему алкоголь.
- Транспортируя пострадавшего в больницу, следите, чтобы он практически не двигался. Лучше разместить его на носилках либо нести на руках. Укушенную конечность необходимо зафиксировать шиной.



Первая помощь при укусе насекомых

- В большей части случаев укусы насекомых вызывают легкую форму реакции – раздражение кожи, зуд, жгучую боль и небольшую отечность. Эти симптомы проходят за один-два дня. Среди возможных отсроченных реакций – высыпания, температура, боли в суставах и некоторое увеличение лимфатических узлов. У небольшого процента людей укус приводит к серьезным аллергическим реакциям (в том числе и к анафилаксии).
- При тяжелых аллергических реакциях у больного отекает лицо, затрудняется дыхание, возникает боль в животе и шок.



- Первая помощь зависит от симптомов, наблюдающихся у пострадавшего, и от того, какое именно насекомое его укусило. Так при укусе клеща стоит расположить поверх него вату, смоченную растительным маслом. Далее аккуратно выньте клеща и обратитесь за медицинской помощью.




- Если вас укусили жалящие насекомые (шершни, пчелы, осы) – выньте аккуратно жало, но не сдавливайте кожу. Приложите к пораженному месту вату, смоченную водкой, спиртом или настойкой календулы. Далее наложите на него повязку, чтобы ускорить заживление или уменьшить отечность.



- При укусах комаров не нужно расчесывать пораженное место. Для снятия зуда наложите компресс из содового раствора либо из перекиси. Чтобы избежать аллергии – примите антигистаминное средство.



При укусах блох, промойте пораженные места мылом либо антисептиком. Поверх укуса наложите холодный компресс. Для устранения зуда можно использовать примочку из содового либо каламинового раствора.



Если укус любого насекомого вызывает боль, примите ибупрофен либо ацетоаминофен (парацетамол). А для устранения зуда лучше всего использовать антигистаминные препараты или методы местного воздействия (описанные выше).



- В том случае, если укус насекомого вызывает серьезное ухудшение самочувствия (серьезную аллергическую реакцию), немедленно вызовите скорую помощь. При этом сохраняйте спокойствие, покиньте место скопления насекомых. Примите антигистаминное средство (к примеру, пару таблеток дифинилгидрамина). При появлении хрипов, стоит вдохнуть бронхолитик для расширения дыхательных путей.



- Если укус вызвал сильную слабость, лягте так, чтобы ноги находились выше головы. Так кровь будет активно притекать к мозгу.



- Аллергикам стоит всегда иметь при себе набор адреналина. При аллергической реакции его нужно ввести, согласно инструкции.



- Если вы оказались рядом с человеком, который потерял сознание и пульс вследствие укуса насекомого, обязательно окажите пострадавшему первую помощь в виде сердечно-легочной реанимации.

- Укусы насекомых и змей могут нести угрозу жизни и здоровью. Поэтому оказание первой помощи в таких ситуациях играет крайне важную роль.



Спасибо за внимание!!!

