

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты.

Аптечка индивидуальная АИ-2

В гнезде № 1 находится противоболевое средство (промедол) в шприц- тубике. Его следует применять при переломах, обширных ранах и ожогах. В экстренном случае укол можно сделать и через одежду. После введения вещества шприц-тубик прикрепляют на видное место к одежде.

В гнезде № 2 (пенал красного цвета) находится средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отравляющими веществами. (тарен, 6 таблеток). По команде прием 1 таблетки, при сохранении признаков отравления ещё 1 таблетка(прием осуществить самостоятельно).Повторно применяют через 5-6 ч.

В гнезде №3 (большой пенал без окраски) находится противобактериальное средство. (15 таблеток, сульфадиметоксина). Прием при появлении желудочно-кишечных расстройств, возникающих после облучения. В первые сутки сразу 7 таблеток в один прием, в последующие 2 суток-по 4 таблетки.



В гнезде № 7 (пенал голубого цвета) находится противорвотное средство(этаперазин).Принять сразу 1 таблетку, после облучения при появлении тошноты, рвоты, а также после ушиба головы.

В гнезде № 6 (пенал белого цвета) находится радиозащитное средство 2(калий йодид, 10 таблеток). Взрослые и дети от 2 лет принимают препарат в течении 7 дней с момента выпадения радиоактивных осадков по 1/2 , 1 раз в день.

В гнезде № 5 (два пенала без окраски) находится противобактериальное средство 1(хлортетрациклин, по 5 таблеток). Прием при угрозе инфекционного заболевания, при ранах и ожогах. Первый прием 5 таблеток, через 6 часов еще 5 таблеток.

В гнезде № 4(два пенала розового цвета) находится радиозащитное средство(цистамин, по 6 таблеток в каждом). Прием- при угрозе облучения, 6 таблеток за один прием. При новой угрозе ещё 6 таблеток через 4-5 ч.

Индивидуальные противохимические пакеты и перевозочные пакеты. (ИПП-8,ИПП,ИПП-10)



ИПП-8
Линия вскрытия оболочки пакета


1. Вскрыть оболочку пакета.
2. Извлечь флакон и тампоны.
3. Отвинтить пробку флакона, его содержимым смочить тампон и протереть открытые участки кожи, шлем-маску.
4. Снова смочить тампон и протереть манжеты и края воротника.

ИПП-10



1. Повернуть крышку, сдвинув ее с упоров; ударив по ней вскрыть сосуд.
2. Снять крышку налить в ладонь 10-15 мл, обработать лицо и шею спереди.
3. Еще налить 10-15 мл и обработать кисти рук и шею сзади.
4. Закрывать сосуд крышкой.

ППИ



Для перевязки ран и ожогов. ППИ представлен марлевым бинтом, на котом размещены две ватно-марлевые подушечки, одна подвижна ,другая-нет. Имеется булавка. Перевязочный материал пакета стерильный.