


Никотин или здоровье человека ?

Автор: Зубкова Оксана Павловна

Здоровье – это вершина, на которую
каждый должен подняться сам.
Н.Н. Брехман









Zeev pipes: #1 Lucida



«Табак приносит вред телу,
разрушает разум, отупляет
целые нации»

(Оноре де Бальзак)

Таблица №1 Результаты исследования причин курения у школьников и студентов.

Возрастные группы	% соотношение зависимости от причин курения.			
	Подражание другим Школьникам, студентам	Чувство новизны, интереса	Желание казаться Взрослым, самостоятельными	Точной причины не знают
Учащиеся				
5-6 классов	50,0	41,5	5,5	3,0
7-8	35,6	30,0	10,4	24,0
9-10	25,6	24,0	15,0	35,5
Студенты				
1-2го курса	3,1	22,5	22,0	47,4
3го курса	0	0	1,2	98,5



СТЕНОКАРДИЯ

КОГДА СЕКУНДЫ РЕШАЮТ ВСЕ...

Стенокардия – самое частое проявление ишемической болезни сердца (ИБС)

ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

КАК ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ВАШЕГО СЕРДЦА

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПРИСТУП

Нитроглицерин аэрозоль

Нитроглицерин (Нитроглицерин). Лекарственная форма. Перед применением прочтите инструкцию. Регистрационное удостоверение. Фармацевтический завод ОАО "ТатНИИФАС".

стенокардия

Инсульт

Зона ишемизированного головного мозга

Тромб в артерии

Ишемический инсульт (инфаркт мозга)

Возникает в 4-5 раз чаще, чем геморрагический. Тромб или атеросклеротическая бляшка закупоривают сосуд, отчего в снабжаемом им участке отмирает ткань.


Симптомы инсульта: внезапный паралич на одной или обеих сторонах лица, рук и ног; внезапная потеря сознания; внезапное нарушение речи; внезапное нарушение зрения; внезапное нарушение равновесия.

Питание при атеросклерозе и гипертензии


Нитроглицерин аэрозоль

Сосуды головного мозга: Задняя мозговая артерия, Передняя мозговая артерия, Средняя мозговая артерия, Виллизиева мозговая артерия, Нижняя мозговая артерия, Верхняя мозговая артерия, Задняя мозговая артерия, Передняя мозговая артерия, Средняя мозговая артерия, Виллизиева мозговая артерия, Нижняя мозговая артерия, Верхняя мозговая артерия.

инсульт



гангрена ног




инфаркт



рак легких



рак полости рта



рак полости рта



рак гортани



Таблица 2. Сокращение жизни курильщиков в зависимости от числа ежедневно выкуриваемых сигарет и от возраста.

Возраст	Сокращение жизни при ежедневном курении следующего числа сигарет			
	1-9	10-19	20-39	Свыше 40
До 25	-4,6	-5,5	-6,2	-8,3
35	-4,5	-5,4	-6,0	-7,9
45	-4,1	-5,0	-5,6	-7,0
55	-3,5	-4,0	-4,4	-5,4
65	-2,8	-2,9	-3,1	-3,4

