

# **Болезни, передаваемые половым путем**

Димитрова Галина Васильевна  
учитель ОБЖ  
ГБОУ СОШ №871



В настоящее время насчитывается около 20 заболеваний, передаваемых половым путем.

**Заведомо известное заражение другого лица венерической болезнью наказывается по статье 121 УК РФ 1997 г. :**

→ штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда

→ или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев

→ либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет

→ либо арестом на срок от трех до шести месяцев

# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



**Сифилис** - это тяжелое заболевание с поражением почти всех внутренних органов, центральной нервной системы, костей и специфическими изменениями кожи и слизистых оболочек.

Сифилис передается как правило, половым путем, но он может быть врожденным или передаваться при переливании крови.

Микроорганизм чувствителен в различным воздействиям и быстро погибает от тепла, холода, мыла, дезинфекции и при высушивании.

# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



## Симптомы сифилиса

Основным симптомом сифилиса первой стадии развития является появление на месте инфицирования **твердого шанкра**.

**Твердый шанкр** - плотное, красное, безболезненное образование с эрозией красного цвета (поверхностной язвочкой) на вершуске.

Стоит внимательно отнестись к этому сигналу, ведь через неделю эрозии исчезают, на их месте воспаляются близрасположенные лимфоузлы.



Твердый шанкр

# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



## Симптомы сифилиса

Симптомы вторичного сифилиса дают о себе знать через 6-8 недель.

На коже появляется сыпь и папулы – маленькие розовые узелки, которые не зудят.

Также могут наблюдаться такие симптомы как выпадение волос, ломкость ногтей.





# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



## Симптомы сифилиса

Третичный период сифилиса (по прошествии 3-4 лет) предполагает воспалительные процессы на любых тканях и органах организма, которые сопровождаются образованием узлов – гуммозов.

При разрушении гуммозов разрушается и ткань, к которой он прикреплен.

На данной стадии болезнь практически не поддается лечению.

Хронический сифилис, поздние стадии его развития имеют тяжелейшие осложнения и последствия, вплоть до летального исхода.



# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем

## Симптомы сифилиса

Хронический сифилис, поздние стадии его развития имеют тяжелейшие осложнения и последствия, вплоть до летального исхода.



0376311.com



# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



**Гонорея** – заболевание, передающееся половым путем, возбудителем которого является гонококк, поражающий слизистые оболочки мочеполовой системы, а при длительном течении и другие органы ( прямую кишку, глаза, слизистую оболочку полости рта и глотки).

Инкубационный период составляет от 2 до 5 дней с момента заражения, после чего появляются **симптомы заболевания**:

- гнойные желтовато-коричневые выделения с неприятным запахом;
- боль и жжение при мочеиспускании;
- воспаление мочеиспускательного канала.

При данной болезни поражаются органы мочеполовой системы, прямая кишка, глаза. При длительном течении гонореи инфекция распространяется на дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную системы. В тяжелых случаях возможно поражение суставов и заражение крови (сепсис).



# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



**Генитальный герпес (герпетическая инфекция)** – вирусное венерическое заболевание, проявляющееся в характерных пузырьковых высыпаниях на половых органах.

## Основные симптомы заболевания:

- язвенные образования на внутренних и наружных половых органах;
- покраснение участка кожи вокруг очага;
- зуд, жжение;
- нарушения мочеиспускания;
- выделения различной интенсивности и характера
- наблюдается общее ухудшение самочувствия: у больного повышается температура, заметно возрастает утомляемость, возможны и лихорадочные проявления.

Несмотря на то, что попав в организм, герпес сохраняется в нем пожизненно, консультация со специалистом все же необходима. Незначительные пузырьковые высыпания при бесконтрольном развитии угрожают превратиться в язвенные поражения, охватывающие значительные участки кожи или слизистой оболочки.

# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



**Хламидиоз** - заболевание, передающееся половым путем, либо в процессе родов инфекция переходит от матери к ребенку, встречается в 2-4 раза чаще гонореи, и 7,5 раз чаще сифилиса. Приводит к бесплодию, внематочной беременности, невынашиванию беременности, внутриутробному инфицированию плода.

**Симптомы:** Белые или желтые выделения из уретры, болезненное мочеиспускание, зуд в области отверстия мочеиспускательного канала, периодические боли в промежности, яичках. Инкубационный период хламидиоза составляет от 5 до 30 дней, но в 50% случаев хламидиоз бессимптомен и проявляется лишь выделением из уретры после сна небольшого количества мутноватой слизи.



Особой опасности при хламидиозе подвержены беременные женщины, у которых инфекция может стать причиной самопроизвольного аборта, неразвивающейся беременности, преждевременной отслойки плаценты и т.д.

# Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



**Трихомоноз** – заболевание, передающееся половым путем, поражает влагалище у женщин и уретру, семенные пузырьки и предстательную железу (простату) у мужчин. Инкубационный период трихомониаза составляет от нескольких дней до нескольких месяцев.

## Основные симптомы у мужчин:

- белесые или серые пенистые выделения;
- зуд в мочеиспускательном канале;
- зуд и жжение при мочеиспускании.

## Характерные симптомы у женщин:

- желтоватые пенистые выделения;
- боль при мочеиспускании;
- покраснение и зуд наружных половых органов.

Через три-четыре недели, если не было проведено лечение, трихомониаз переходит в хроническую форму.

Трихомонадная инфекция из уретры распространяется и на другие органы мочеполовой системы, становясь причиной хронического простатита, орхита, эпидидимита, везикулита, воспаления мочевого пузыря и почек, бесплодия.

# Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем



Самый надежный способ уберечься от БППП - это полное воздержание от беспорядочных половых связей.

Чтобы предотвратить заражение при контакте сексуальных партнеров необходимо пользоваться средствами контрацепции и соблюдать правила личной гигиены.

Необходимо заботиться о собственной безопасности и если есть первые симптомы лучше перестраховаться и сдать анализы. Чем меньше времени прошло

## Список использованных источников информации:

1. [www.abc-gid.ru/diseases](http://www.abc-gid.ru/diseases) www.abc-gid.ru/diseases  
Журнал ABC
2. Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васильев
3. [www.siviliz.ru](http://www.siviliz.ru)
4. [www.alleng.ru](http://www.alleng.ru)
5. [www.google.ru/ images](http://www.google.ru/images) «Венерические заболевания» - все картинки