




Круглий стіл "ДИХАЙ ВІЛЬНО: захворювання легень і тютюнокуріння

ВТРАТИ ВІД ТЮТЮНУ: ВИМІРЮЄТЬСЯ ЖИТТЯМ І ЗДОРОВ'ЯМ


**Н.О. Рингач, д. н. держ. упр.,
19 листопада 2015 р.,
Київ**

Стеля у кімнаті для куріння.....





Ціна тютюнопаління – роки здорового життя



- Тютюнопаління для регіону Південної та Східної Європи та Центральної Азії, до якого відноситься Україна – чинник, перший за значущістю з переліку 25 основних факторів ризику у формуванні показника DALY (disability-adjusted-life-year), що визначається як кількість втрачених років здорового життя.
- асоційовані з тютюном хвороби в регіоні спричиняють найвищу смертність (на рівні 160-180 на 100 тис. нас.) та найбільшу кількість втрачених років потенційного життя (близько 4.000 на 100 тис. нас.).

Внесок хронічних захворювань легень (ХЗЛ) у формування Глобального тягаря хвороб **в світі**: за числом смертей



Місце за рангом	1990	Місце за рангом	2010	Зміни, %
1	Ішемічна хвороба серця	1	Ішемічна хвороба серця	35
2	Інсульт	2	Інсульт	27
3	Інфекції нижніх дихальних шляхів	3	Хронічна обструктивна хвороба легень	-7
4	Хронічна обструктивна хвороба легень	4	Інфекції нижніх дихальних шляхів	-18
5	Діарея	5	Рак легень	51
6	Туберкульоз	6	ВІЛ/СНІД	395
7	Ускладнення передчасних пологів	7	Діарея	-42
8	Рак легень	8	ДТП	46
9	Малярія	9	Діабет	95
10	ДТП	10	Туберкульоз	-17
15	Діабет	11	Малярія	20

- Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010

Внесок хронічних захворювань легень (ХЗЛ) у формування Глобального тягара хвороб в Європі: за числом смертей




Ранг	Східна Європа		Західна Європа	
	1990	2010	1990	2010
1	Ішемічна хвороба серця	Ішемічна хвороба серця	Ішемічна хвороба серця	Ішемічна хвороба серця
2	Інсульт	Інсульт	Інсульт	Інсульт
3	Рак легень	Рак легень	Рак легень	Рак легень
4	Хронічна обструктивна хвороба легень	ВІЛ/СНІД	Хронічна обструктивна хвороба легень	Хронічна обструктивна хвороба легень
5	Рак шлунку	Хронічна обструктивна хвороба легень	Інфекції нижніх дихальних шляхів	Хвороба Альцгеймера

Внесок хронічних захворювань легень у формування Глобального тягара хвороб в Україні: за числом смертей



	1990		2010	Зміни порівняно з 1990, %
1	Ішемічна хвороба серця	1	Ішемічна хвороба серця	36
2	Інсульт	2	Інсульт	-15
3	Хронічна обструктивна хвороба легень	3	ВІЛ/СНІД	3940880
4	Рак легень	4	Рак легень	-48
5	Рак шлунку	5	Хронічна обструктивна хвороба легень	-46

Оцінка міжнародних експертів дещо перевищила національну статистику смертей від хронічної обструктивної хвороби легень



- 15762 смертних випадків – оцінка міжнародних експертів в межах ГТХ-2010 Офіційна (Держстат України) – 12749. Чому??
- в Україні відносно рідше визначають цю хворобу як причину смерті, особливо серед старших осіб
- перша за значущістю патологія, що визначає смертність за класом «Хвороби органів дихання» - хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (майже 60% смертей)
- За ХОД - 2,5% всіх смертей в Україні, та 4% у групі працездатного за віком населення, найвищі рівні – для старших 80 р., найвагоміша частка - серед групи 35-44 р.

Втрати років потенційного життя: внесок захворювань легень




- В Україні, згідно, дослідження Global burden of disease-2010 **хронічна обструктивна хвороба легень** в сумі з основними серцево-судинними захворюваннями та раком легень детермінували практично половину всіх втрат
- **Дослідження ІДСД НАНУ:** Нами розраховано, що у 2013 р. через смертність від всіх хвороб органів дихання до досягнення 65 років було втрачено 117075 людино-років недожитого життя, або близько 4% всього масиву потенційного життя, втраченого через передчасну смерть)
- Сильна стать втрачає більше - показник для чоловіків більш ніж втричі вищий (478,2 на 100 тис. відп. нас проти 141,2)
- *АЛЕ: кількість недожитих років потенційного життя через вживання тютюну в Україні значно вища!*


Внесок хронічних захворювань легень (ХЗЛ) у формування Глобального тягара хвороб в світі: за числом ВРПЖ



Ранг, 2010	Причина	Кількість років втраченого життя, тис.	Частка, %
1	Ішемічна хвороба серця	4687	32,2
2	Інсульт	1644	11,4
6	Рак легень	386	2,6
8	Хронічна обструктивна хвороба легень	275	1,9

Смертність від хвороб органів дихання, за євростандартом, 2013 р.





Висновки

В Україні спостерігається превалювання тютюно-асоційованих хвороб як причин смерті, що зумовлює провідну роль цієї патології у формуванні реальних і потенційних втрат внаслідок смертності. Хвороби, прямо чи опосередковано пов'язані з тютюнопалінням, здійснюють основний внесок у формування показника втрачених років здорового життя в Україні.

- Постаріння населення виступатиме як чинник зростання поширеності хронічної патології легень
- **На сигаретах слід писати не "Куріння вбиває ", а "Щасливі люди не курять!"**



Дякую за увагу!

Всім здоров'я, миру та благополуччя!