

ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ:»КУРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ»

- *Курение - вид бытовой наркомании, наиболее распространенная форма которой - никотинизм - курение табака.*



Из чего состоит сигарета



Болезни от курения

КУРЕНИЕ — ОПАСНО!



В мире от курения ежегодно умирают **5 миллионов** человек, в России - от **300 до 500 тысяч** человек.

Источник: «РИА Новости», ria.ru

IMPROVE
ALLIANCE

Алексей Кремлёв



(c) Wenz



УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ?



RC-MIR.com

Почему курят подростки



Подростки
начинают
курить, чтобы...

Доказать свою
независимость
от родителей


Их уважали

Быть принятым
в компанию
сверстников,
если те курят

Чувствовать
себя частью
группы

Сверстники
испытывали в
них потребность

Почему курят взрослые люди



К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ



Рак легкого является одной из самых распространенных злокачественных опухолей. Факторы, влияющие на заболевание раком легкого: усиление загрязнения атмосферного воздуха и табакокурение.


Курение и беременность



кто если не ВЫ?

DruckHouse.info

Курение во время беременности может крайне негативно отразиться на здоровье будущей мамы и ее малыша. У будущего ребенка проблемы со здоровьем могут возникнуть еще в утробе матери и проявляться вплоть до совершеннолетия.



Как влияет курение на женщин

Женщины курят, потому что..

Боятся располнеть

Хотят быть красивыми и стройными

Только в развитых странах от болезней, вызванных курением, умирает более полумиллиона женщин. В этот мрачный список болезней входят болезни сердца.



Алексей Кремлёв



Тебе оно надо?

Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря встречается в основном у курильщиков старше 40 лет. У мужчин риск в 4 раза выше, чем у женщин. Самый частый ранний симптом - появление крови в моче без боли.

Язва желудка

Симптомы:

Ноющая или жгучая боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита и похудание.

Эффект длительного курения заключается в соляной кислоте в желудке, разъедающей защитный слой в его полости. Ноющая или жгучая боль между грудиной и пупком - самый частый симптом, возникающий после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов; бывает, что боль облегчает еда. Курение замедляет заживление язв и способствует их повторному возникновению.



Рак пищевода

Симптомы:

**Затрудненное глотание, боль
или дискомфорт в груди,
похудание.**

**Курение может вызывать рак
пищевода за счет повреждения
клеток, расположенных внутри
органа. Чем дольше курит
человек, тем выше риск.**

Заключение и вывод

**507 часов
В ГОД
у вас ворует**



сигарета!

1. Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания: хронического бронхита, хронической болезни легких, пневмонии.
2. Курение табака - фактор риска атеросклероза, инфаркта миокарда, болезней сосудов.
3. Курение табака в период беременности приводит к недоразвитию плода и ранним выкидышам.
4. Курение табака – основной фактор риска сердечных заболеваний.