

Монголоидная раса



*Выполнили: ученики 11 «Б» класса Смирнова
Ксения, Халявина Наталия, Осюхина Мария,
Пережогин Вадим, Осипов Максим.*

Г. Череповец, 2012г.

Монголоидная раса, представители

Эскимосская женщина,
1907



- **Монголоидная раса** - раса коренных обитателей восточной и северной Азии, а также Крайнего севера.
- Одним из ярких представителей монголоидной расы являются монголы.
- К классическим монголоидам относятся калмыки, буряты, тувинцы и якуты. Также монголоидами являются сибирские татары (с примесью западносибирской расы). У японцев и китайцев наблюдается примесь австралоидной расы. У жителей Индокитая и Юго-Восточной Азии эта примесь ещё более очевидна.

История, место обитания

- В эпоху неолита инципиентная монголоидность появляется в Европе (Бавария). Однако типичнейший признак монголоидной расы — лопатовидные резцы — обнаруживается уже у синантропов, живших 420 тыс. лет назад.



Характерные признаки




- Иное строение разреза глаз с сильно развитой складкой верхнего века (эпикантус)
- Чёрные жёсткие прямые, реже волнистые волосы
- Тёмные глаза
- Смуглый, часто желтоватый цвет кожи
- Слабое развитие третичного волосяного покрова
- Сильное выступание скул
- Уплощённое лицо

Строение верхнего века и эпикантуса


Эпикантус, «монгольская складка» — особая складка у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слёзный бугорок. Эпикантус является продолжением складки верхнего века.

Один из признаков, характерных для монголоидной расы, редкий у представителей других рас. При антропологических обследованиях определяется не только наличие или отсутствие эпикантуса, но и его развитие.



Складка верхнего века и эпикантус

a — складки и эпикантуса нет;
б — складка развита сильно, эпикантуса нет;



в — складка развита сильно, эпикантус — слабо;
г — складка и эпикантус развиты сильно

Разновидности монголоидной расы

<i>Восточный</i>	<i>Уральская</i>	Уральская
	<i>Сибирская</i>	Самодийская (нганасаны) Таежная (эвенкийская) Центральноазиатская (монгольская) Парацентральноазиатская (тюрская) Арктическая сибирская Арктическая азиатско-американская
	<i>Южноазиатская</i>	Китайская Мяо-яо Южноазиатская вьетская Южноазиатская кхмерская Островная (японцы)
	<i>Американская</i>	Тихоокеанская Атлантическая Центральноамериканская Амазонская Андская Неоарктическая Патагонская

Монгольское пятно

Монгольское пятно — синеватая окраска кожи в области крестца, реже ягодиц, бедра. Объясняется залеганием пигмента меланина в соединительнотканном слое кожи. М. п. впервые описаны у монголоидов (отсюда название), но встречаются и у детей других рас. Название «монгольское пятно» не совсем точно.



Несмотря на то, что его имеют 100 % японских детей, оно встречается и в Европе, хотя и редко (например, в Болгарии 0,6 %). Встречается у монголов, казахов, кыргызов, якутов, айнов, корейцев, бурятов, калмыков, тувинцев и индейцев Северной Америки. Монгольское пятно появляется на второй или третий день после рождения. Проходит на 12-24 месяца, крайне редко остается в слабом виде у взрослых.





Примеры монголоидной расы




Сравнение с другими расами



Носовые отверстия:
европейского типа (вверху),
монголоидного (в середине) и
негроидного типа (внизу).



Сравнение с другими расами



Соотношение рас на земле



Название расы.	% соотношение.
Европеоидная раса	43
Монголоидная раса	19
Негроидная раса	8
Смешанные расы	30

Смешанные расы

Метисы – потомки
европеоидной и монголоидной
расы



Самбо-потомки
монголоидной и
негроидной расы.

