

Наркомании и токсикомании

Лекция 3

Лектор Асимова Т. А.

Сравнительная характеристика различных видов наркотиков

ПРИЗНАКИ	КАННАБИНОИДЫ (F12)	ОПИАТЫ (F11)	ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ (F15)	КОКАИН (F14)
названия	марихуана - «травка»; гашиш – «анаша», «план», «дурь»; гашишное масло	<u>натуральные</u> : опнопон, маковая соломка; <u>синтетические</u> : промедол, методон; <u>полусинтетические</u> : героин.	амфетамин, препараты эфедрина (эфедрон, первитин), кофеин.	кокаин
способы введения	курени, внутрь	парентерально, курение, вдыхание	внутри, внутривенно, интраназально	интраназально, курение, разжевывание
дозировка	2-3 - 4-5 и более сигарет	от 3 инъекций	от 2-5 мл	
толерантность	медленно нарастает	от 1 месяца (повышение во второй стадии)	повышение после недели применения	повышается резко (очень резко при интраназальном применении)

ПРИЗНАКИ	КАННАБИНОИДЫ (F12)	ОПИАТЫ (F11)	ПСИХОСТИМУЛЯ- ТОРЫ (F15)	КОКАИН (F14)
особенности эйфории	от 30 мин. до неск-ких часов	сразу после введения (длится от 40 сек. до неск-ких часов)	начинается ч/з 15 мин. длится 6-8 часов	в/в – через 2 мин., интраназально через 5-10 мин.
психическая зависимость	ч/з 1-2 мес. регулярного употребления	от 3-5 инъекций до 2-3 мес.	3 дня – 4 нед.	+
физическая зависимость	ч/з 2 -3 года регулярного употребления	3 нед – 1,5 мес.	2-12 нед. регулярного употребления	+
абстинентный синдром	апогей на 3-5 сут. длительность – 10-40 сут	через несколько часов после приема дозы. пик – 36-72 часа, наиболее остро в течение – 10 дней	триада: нарушение сна, аффективные расстройства, астения (4-21 день)	если эйфория больше 24 часов, то = абстиненция (до 1 мес.)
рвота	+	при абстиненции на 3-4 сут	может быть	при интоксикации
галлюцинации	грёзеподобные переживания	нет или редко	фотопсии или зрительные иллюзии	эпизодические слуховые, тактильные, зрительные.

ПРИЗНАКИ	КАННАБИНОИДЫ (F12)	ОПИАТЫ (F11)	ПСИХОСТИМУЛЯ- ТОРЫ (F15)	КОКАИН (F14)
остаточные явления	ХОБЛ, рак дыхательных путей	астения, анергия, полиневриты, гепатиты, пневмонии, флебиты	астения, ОНМК (инсульты), судорожные припадки	стойкие бредовые, прободение носовой перегородки
психозы	шизоформные, галлюцинаторно-параноидные	-	галлюцинации, бред	транзиторные, исчезают после ночного сна, по окончании эпизода
изменение личности	амотивационный, псевдопаралитический синдромы, снижение памяти, рассеянное внимание	сужение круга интересов, снижение внимания, памяти, морально-этических норм, эмоциональное огрубение	как и в опиатах + деперсонализация, бред преследования, дезориентировка	суицидальное поведение, кокаиновые делирий, онейроид, параноид

Сравнительная характеристика различных видов токсикоманий

ПРИЗНАКИ	СЕДАТИВНЫЕ (F 13)	ТАБАК (F17)	ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ (F18)
Название	Барбитуровые (этамилал Na, амитал Na), продолжительность действия: короткое промежуточное длительное	Папиросы, сигареты, сигары, лист табака	Алифатические у-водороды (этан, пропан), ароматические эфиры (бензол, толуол), кетоны (этилацетат, ацетон), бытовая химия (клей, краски, маркеры и т.д.)
Способ введения	Внутрь, в/в	Курение, закладывание за губу	Ингаляционный, аппликационный
Доза	0,4-0,8 г.	От нес-х сигарет, до 2-3 пачек в сут.	15-20 вдохов за прием
Толерантность	постепенно возрастает	постепенно возрастает	резко возрастает

ПРИЗНАКИ	СЕДАТИВНЫЕ (F 13)	ТАБАК (F17)	ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ (F18)
Эйфория	Сглажена, повышение эмоционального состояния, приливи сил, желание двигаться, усиление аппетита длиться до 4-х часов, после – сон	Ощущение повышения работоспособности, улучшение самочувствие	Симпотом «ЭХО» прекращается через 1,5 часа после последнего вдоха
Психическая зависимость	+	+	+
Физическая зависимость	В зависимости от дозы	+	+
Абстинентный синдром	В первые 24 часа, пик на 3-4 сут, редуцирование медленное	Дискомфорт, беспокойство, резкое влечение к табакокурению	Формируется через 4 мес., исчезает через 3-4 дня
Рвота	При абстиненции	-+	Во время интоксикации

ПРИЗНАКИ	СЕДАТИВНЫЕ (F 13)	ТАБАК (F17)	ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ (F18)
Галлюцинации	Вербальный галлюциноз	-	Зрительные, слуховые тактильные, термические панорамные, фантастические
Изменение личности и психики	Лживость, эгоистичность, грубость, неряшливость, психопатоподобный органический дефект	Морально-этические и поведенческие изменения у детей	Агрессия, равнодушие, снижение интеллекта, раздражительность, отсутствие критики, психопатоподобное поведение
Психозы	Делирий, галлюцинаторно-бредовые идеи	-	Несистематизированные бредовые идеи
Остаточные явления	Энцефалопатия, барбитуровая деменция	ХОБЛ, гиперацидный гастрит ИБС, ИМ, ЯБЖ и ДПК, облитерирующий эндартериит	Отсутствие нравственно-этических норм
Интеллектуально-мнестические расстройства	Раздражительность, гипомнезия, расстройство внимания	Рассеянность, снижение интеллекта	Рассеянность, апатия, эйфория

**КУРС ЛЕКЦИЙ ПО НАРКОЛОГИИ
ЗАКОНЧЕН!**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!