

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНАХ И КРОВОТЕЧЕНИЯХ



Рана - повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, сопровождающиеся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек.

В зависимости от формы ранящего предмета или вида оружия раны разделяют на резанные, рубленные, колотые, рваные, ушибленные, укушенные и огнестрельные.



Крови мало ->
опасность инфекции >
промываем и накладываем повязку

Пример: содрал коленку
-для промывки годится
любая бесцветная
жидкость, которую
можно пить
-для повязки чистая
(относительно) ткань



Крови много ->

опасность

кровопотери ->

давящая повязка

Пример: чиркнул ножом
по пальцу

-накладываем повязку

- если продолжает
сочиться кровь,
то накладываем еще
повязку и сильнее
прижимаем

- не снимаем уже
пропитавшуюся



Фонтан ->

очень быстрая


кровопотеря ->

зажать артерию, жгут


Места пережатия
артерий:

- Нижняя треть плеча

- Средняя треть бедра



Способы наложения кровоостанавливающего жгута.



Правила наложения жгута

Жгут накладывается лишь в крайних случаях, ибо он очень часто вызывает необратимые повреждения.

- накладывается выше раны
- накладывается на одежду (если одежды нет — подкладываем).
- жгут накладывать быстро, снимать медленно, постепенно.
- пишем дату и время наложения жгута **на лбу** (чем угодно)
- время: зимой — 1 час, летом — 2 часа,
- потом ослабить на 5—10 минут и наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения
- **жгут должен быть виден!**
- проверить, что жгут наложен правильно — отсутствует пульс на конечности

Чего не делать

- в рану не лезем
руками!
- из раны ничего
не достаем!
- не снимаем уже
пропитавшуюся
повязку



Носовое кровотечение

- обеспечение психофизиологического комфорта
- голову слегка наклонить вперед, попросить пострадавшего поддержать её руками
- прикладывать тряпочки к носу
- холод на нос
- если через 10-15 минут не останавливается — вызвать «скорую»
- нельзя запрокидывать назад голову – возможна кровавая рвота



Внутреннее кровотечение

- вызвать «скорую»
- холод на область живота
- противошоковые меры

Признаки и симптомы внутреннего кровотечения

- человек слабеет, боли может и не быть
- бледность, холодный пот, озноб
- «мушки перед глазами», головокружение
- дыхание слабое, поверхностное
- вздутый, твердый, болезненный при надавливании живот «поза эмбриона»
- может быть синяк на животе



Рана на голове / Проникающее ранение головного мозга

- накладываем чистую повязку
- немедленно вызываем «скорую»
- не промываем
- не трогаем



Травматическая ампутация

- оторванную конечность положить в пакет, его во второй и охладить.

- контейнер отправить вместе с больным.

Время — до 6 часов

- срочно «скорую»!

Обязательно говорим,
ампутация

- есть шанс пришить
до локтя и до колена

