

Подростковый алкоголизм



В последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом среди подростков, возраст больных алкоголизмом с каждым годом уменьшается, а статистика употребления алкоголя детьми увеличивается



Причины подросткового алкоголизма



- приобщение к алкоголю в семье;
- телевидение, реклама и другие средства массовой информации;
- обилие алкогольной продукции в продуктовых магазинах и относительная ее дешевизна;
- «пьяницы рождают пьяниц»;
- взаимоотношения в семье ребенка.




Изменение стиля жизни под влиянием алкоголя





У подростков устойчивость к алкоголю очень низка (50 – 100 мл водки), при этом, чем меньше возраст, в котором впервые произошло опьянение, тем она ниже. При постоянном приеме алкоголя (до 2 – 3 раз в течение месяца) устойчивость к воздействию алкоголя у подростка увеличивается. **Образ жизни, характерный для «алкогольной» компании, ошибочно воспринимается подростком как нормальный и естественный.** Естественным считается прием алкогольных напитков в выходные дни, перед дискотекой и во время отдыха с друзьями. Вместо активной социальной жизни круг интересов сужается до проблем, обсуждаемых в «алкогольной» компании.

Статистика подросткового алкоголизма





- 1 раз в месяц
- 2 раза в месяц
- группа риска



**Всего лишь 4% учащихся ни
разу не пробовали
алкоголя!**

Последствия регулярного употребления алкоголя подростками **гораздо серьезнее и опаснее, чем алкоголизм в зрелом возрасте.**

1. **Раннее ослабление половых функций.**

Бесплодие , к ранние аборты.

2. Опасность заражения **венерическими болезнями или инфекциями**, передаваемыми половым путем, гепатитами В или С, ВИЧ-инфекцией.

3. Сбои в работе **желудочно-кишечного тракта.**

4. Повреждение **печени**, развитие гепатита, цирроза печени.

5. Нарушения в работе **поджелудочной железы** (панкреатит, перитонит).

6. Нарушение деятельности **сердечно-сосудистой системы.**

7. Развиваются воспалительные заболевания **почек и мочевыводящих путей.**

8. Появление различных воспалительных заболеваний в **легких, бронхах, гортани, носоглотке** (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмоклероз, туберкулез легких).

9. Снижение **иммунной защиты** организма.

10. Непоправимый вред **эндокринной системе.**

11. Возможное развитие и очень сложное протекание **сахарного диабета.**

12. Изменение состава **крови**, анемия и т.д.

13. Разнообразные **расстройства**, преимущественно в эмоциональной и волевой сфере.

Лечение детского алкоголизма

Очень важно как можно раньше **диагностировать** заболевание и начать лечение, чтобы избежать развития **осложнений**. Подростковый алкоголизм достаточно **сложно** поддается лечению, из-за неспособности использовать некоторые лекарственные препараты по причине раннего возраста больного. Лучше лечение проводить **в стационаре** под обязательным контролем врачей, **домашнее лечение** исключается.

Профилактика подросткового алкоголизма

Личность формируется с детства. Поэтому

профилактика алкоголизма начинается,

прежде всего, с детского и подросткового

возраста, с формирования здоровой в

психическом и физическом плане личности.

Профилактика детского и подросткового

алкоголизма должна проходить одновременно в

нескольких направлениях:

**1. Профилактика алкоголизма на уровне
семьи.**

**2. Профилактика алкоголизма на уровне
школы.**

3. Профилактика со стороны государства

***Проблеме подросткового
алкоголизма нужно уделять особое
внимание, не пускать все на самотек.
Дети – наше будущее, и если не
обратить на это внимание сегодня,
завтра, возможно, будет уже поздно!***

