




Токсикомания

ПЛАН

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ
- группы токсических веществ
- **СИМПТОМЫ:**
 - ❖ синдром психической зависимости
 - ❖ Синдром измененной реактивности
 - ❖ Синдром физической зависимости
 - ❖ Синдром последствий хронической интоксикации
- стадии токсикомании
- признаки употребления
- ЛЕЧЕНИЕ
- ПРОФИЛАКТИКА
- ТЕСТ
- ✓ **1 ВОПРОС**
- ✓ **2 ВОПРОС**
- ✓ **3 ВОПРОС**
- ✓ **4 ВОПРОС**
- ✓ **5 ВОПРОС**
- ✓ **КОНЕЦ**





ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- **Токсикомания** - злоупотребление теми веществами, которые не входят в список наркотиков.

Это различные химические, биологические и лекарственные вещества, вызывающие привыкание и зависимость.

группы токсических веществ:



- Морфин, опий
- Кокаин и препараты из него
- Вещества, добываемые из индийской конопли (гашиш, анаша)
- Снотворные (барбитураты, бромурал)
- Стимуляторы (кофеин, допинги)
- Транквилизаторы.
- Атропин (астматол, белладонна).
- Ненаркотические анальгетики (анальгин, амидопирин)
- Органические растворители и средства бытовой химии.
- Никотин.



СИМПТОМЫ

СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

- *Означает, что психическое состояние больного уже определяется наличием или отсутствием в его организме опьяняющего вещества. Отсутствие его вызывает раздражительность, конфликтность, беспокойство, невозможность на чем-либо сосредоточиться, так как мысли заняты только тем, где достать одурманивающее средство. Тот, кто препятствует достижению цели, вызывает ненависть, те, кто способствует, -симпатию.*

Синдром измененной реактивности

- *Это показатель привыкания - свидетельствует об изменении биотрансформации вещества и искаженном ответе на интоксикацию физиологических систем. Прием вещества в прежних дозах не оказывает желаемого эффекта, действие его укорачивается, при передозировке не возникают защитные реакции. Рост переносимости проявляется в высоких разовых и суточных дозах, в способности переносить ежедневную интоксикацию, в исчезновении постинтоксикационных расстройств*

Синдром физической зависимости

- показывает, что в болезнь вовлечены все системы организма - образовался новый, наркоманический гомеостаз. Вне опьянения развивается абстинентное состояние: расслабленность, падение мышечного, сердечнососудистого тонуса, невозможность выполнять даже неквалифицированную физическую работу.


. Синдром последствий хронической интоксикации

- имеет основой неуклонно наступающее психофизическое, энергетическое истощение. Психические изменения развиваются в диапазоне от астенического синдрома, неврозоподобных состояний до апатоабулического синдрома и грубой деменции органического характера. Обязательна психопатизация личности, которая утяжеляется социальным конфликтом токсикомана.



стадии токсикомании

- 1 стадия - синдром измененной реактивности и синдром психической зависимости;
- 2 стадия - качественное изменение этих синдромов и присоединение синдрома физической зависимости;
- 3 стадия - дальнейшее качественное изменение всех трех синдромов.



признаки употребления

- следует обращать внимание на подъем настроения, неясность сознания и вегетативную симптоматику. Поведение всегда неадекватно ситуации контакта пациента с врачом: отсутствие должной серьезности, избыточная инициатива в беседе, обсуждение не относящихся к предмету разговора тем
- Особо следует обращать внимание на величину зрачков, фиксацию взора, ясность радужки, кровенаполнение поверхностных тканей, мышечный тонус,, координацию, частоту сердечных сокращений.



Лечение



■ проводят только в специализированном стационаре закрытого режима или в отведенных для наркоманов отделениях психиатрических больниц. Все острые состояния, особенно с симптоматикой двигательного возбуждения, требуют поддержания сердечно-сосудистой деятельности, острые психозы - назначения седативной терапии.





Профилактика

- *Медицинская профилактика включает санитарное просвещение, контроль за назначением наркотиков и наркотически действующих медикаментов (строгое соблюдение показаний, кратковременность, контроль за дозой, чередование препаратов во избежание привыкания), своевременное выявление случаев злоупотребления (первичная профилактика), контроль за ремиссией после лечения, предупреждение рецидива (вторичная профилактика).*



1 ВОПРОС

► Какой из данных симптомов не существует при болезни токсикомания?



Психическая зависимость

Измененная реакция


Физическая зависимость

Торможение



ПОДУМАЙ
ЕЩЕ.....





УРА!!!!!!

ПРАВИЛЬНО!!!!!!

МОЛОДЕЦ!!!!!!

2 ВОПРОС



- Сколько стадий токсикомании существует?
- 2
- 3
- 5
- 8





ПОДУМАЙ
ЕЩЕ.....





УРА!!!!!!

ПРАВИЛЬНО!!!!!!

МОЛОДЕЦ!!!!!!


3 ВОПРОС

- Каких признаков токсикомании не существует?
- Увеличенные зрачки
- Учащиеся сердцебиения
- бессонница
- плохой мышечный тонус



ПОДУМАЙ
ЕЩЕ.....





УРА!!!!!!

ПРАВИЛЬНО!!!!!!

МОЛОДЕЦ!!!!!!

4 ВОПРОС

- Где проводят лечение токсикомании?




- специальный стационар
- Дома
- у знакомых
- поликлиника



ПОДУМАЙ
ЕЩЕ.....





УРА!!!!!!

ПРАВИЛЬНО!!!!!!

МОЛОДЕЦ!!!!!!


5 ВОПРОС

- В чем не заключается медицинская профилактика?
 - санитарное просвещение
 - контроль за назначением наркотиков
 - Предложение наркотиков
 - контроль за ремиссией после лечения



ПОДУМАЙ
ЕЩЕ.....





УРА!!!!!!

ПРАВИЛЬНО!!!!!!

МОЛОДЕЦ!!!!!!

RUHE