



**Министерство здравоохранения
Банк**

**Республики Узбекистан
ТашИУВ**

Всемирный

**Распространенность табакокурения и
последствия для здоровья населения
Узбекистана**

Маматова Н., Усманова Г., Махкамova Н.

г.Ташкент, 13 декабря 2007г.


900igr.net

Цель


- Оценить распространённость употребления табачных изделий
- Оценить влияние на здоровье населения
- Оценить последствия табакокурения для экономики страны



Методология (1)



Методология (2)



Методология (3)



- (1) Злокачественные новообразования
- (2) Сердечно-сосудистые заболевания
- (3) Заболевания дыхательной системы
- (4) Заболевания пищеварительной системы

Анализ данных
обследования
домохозяйств

Общая распространенность употребления табака по полу, 2006


Мужчины больше употребляют насвай!!!!!!




Возраст начала курения сигарет и насвая

между городом и селом почти не отличается

Бросай
курить!




Общий стаж курения курящих мужчин, по возрастам




Пик распространенности употребления табачных изделий приходится на возраст 30-49 лет!!!!!!

распространенность употребления табака среди мужчин по стажу



С повышением уровня образования повышается употребление сигарет, уменьшается потребление насвая!!!


Распространенность употребления сигарет и насвая среди мужчин по
образовательному уровню



С повышением уровня доходов увеличивается потребление сигарет и уменьшается потребление насвая!!!


Распространенность употребления табака среди мужчин по доходам в

2006 г. (в %)



В столице больше употребляют сигареты, в селе больше употребляют насвай!!!!


Распространенность употребления табака среди мужчин по месту проживания



Большая часть заядлых курильщиков (курившие по 11+ сигарет /день) находилась среди мужчин среднего возраста - 26% и 43% в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет!!!!

40-49 лет!!!!


%доля интенсивно курящих мужчин по возрасту




31% ежедневно потребляющих насвай находятся в возрасте от 30 до 39 лет

Интенсивность употребления насвая среди мужчин по возрастным группам

- Ежедневно как % доля от общего числа употребляющих насвай
- ▨ Ежедневно как % доля внутри возрастной группы




Только 9% респондентов считают, что больше всего от сигареты страдают сердце и сердечно-сосудистая система
Знание о вреде сигарет



15% не знают о вреде насвая

Знание о вреде насвая



рот и его части

не знают


желудок/система пищеварения

прочие

Информацию о вреде сигарет в основном получают через телевидение



Источники информации о вреде употребления табачных изделий (%)




На принятие решения о начале курения больше


Бросай курить!




вливают друзья и подруги




Пассивное курение



Причины прекращения сигарет




Причины прекращения насвая




- перестало нравиться;
- ухудшилось здоровья;
- другие причины

Основные места покупки сигарет




Количество сигарет, обычно покупаемое курящими




Последствия
табакокурения для
здоровья


Заболеваемость, приписываемая воздействию курения



Смертность, приписываемая воздействию курения (2004г.)



Смертность приписываемая воздействию курения по нозологиям



Годы потерянной потенциальной жизни по причине курения (ГППЖ), 2004г.

Человек, умерший от курения, в среднем потерял **12,0 лет** своей потенциальной жизни

НАИМЕНОВАНИЕ	ГППЖ	
	Минимум	Максимум
Злокачественные новообразования	7,5	18,4
Сердечно-сосудистые заболевания	4,4	17,3
Респираторные заболевания	14,4	17,5
Всего	4,42	18,9 ₂₉

