

Охраняемые млекопитающие Рязанской области.




Презентация
учителя начальных классов
МБОУ «Школа №34» г. Рязани
Щетининой Галины Николаевны.

Бурый медведь



• Бурый медведь - лесное животное. Обычные места его обитания - сплошные лесные массивы с буреломом и с густой порослью лиственных пород, кустарников и трав. Крупный хищный зверь, хотя в его рационе растительная пища (плоды, корневища, стебли высокая трава) составляет более 50%, а в отдельные периоды до 100%. Значительную долю в его питании занимают насекомые и их личинки, падаль и крупные позвоночные животные. Линька у бурых медведей происходит дважды - осенью и весной. Весенняя линька длится долго и наиболее интенсивно идёт в период гона. Осенняя линька идёт медленно и незаметно, кончаясь к периоду залегания в берлогу. Гон у медведя проходит в мае - августе. Самка размножается один раз в 3 года. Половая зрелость наступает на третьем году жизни. Беременность длится 194-278 суток. Детеныши рождаются зимой в берлгах совершенно беспомощными и массой всего около 500 г (максимальный вес взрослого медведя 750 кг). В выводке 1-3, редко 4-5 детенышей. Лактация длится около 6 месяцев. Молодняк держится с самкой до 2-2,5 года. Самцы и самки территориальны, индивидуальный участок в среднем занимает от 73 до 414 км, причём у самцов он примерно в 7 раз больше, чем у самок. Границы участка помечаются запаховыми метками и «задирами» - царапинами на приметных деревьях. Иногда совершает сезонные кочёвки.







WWW.TICHYPHOTO.COM

Белка - летяга



- Белка-летяга внешне похожа на небольшую короткоухую белку, но между передними и задними ногами у неё имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью - летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. В отличие от других летяг, у обыкновенной летяги нет летательной перепонки между задними ногами и основанием хвоста. мех у летяги густой, мягкий, шелковистый, значительно нежнее и гуще, чем у белки. Верх тела окрашен в серебристо-серый цвет, часто с охристым или бурым оттенком, низ тела - белый с палевым налётом. Глаза окружены чёрным ободком. Белка-летяга населяет старые лиственные и смешанные леса с примесью осины.







Выхухоль


Выхухоль, млекопитающее семейства кротовых отряда землеройкообразные. Русская выхухоль — относительно крупный зверь: тело длиной 18—22 см, хвост — такой же, масса до 520 г. Хвост покрыт роговыми чешуйками, а вдоль верха его ещё и жёсткими волосами, образующими киль. Выхухоли практически слепы, но обладают развитым обонянием и осязанием.



БУРОЗУБКА.



Землеройка бурозубка



Это мелкие зверьки, внешне похожие на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка. К землеройкам относятся самые маленькие млекопитающие: крошечная бурозубка и многозубка-малютка — длина их тел 3—4 см, весят они около 2 г. Самая крупная землеройка, гигантская многозубка весит всего 200 г при длине тела 18 см. Голова у землероек довольно крупная, с удлинённым лицевым отделом. Нос вытянут в подвижный хоботок. Глаза очень маленькие. Конечности короткие, 5-палые. мех короткий, густой, бархатистый. Хвост от очень короткого до очень длинного, превышающего по длине туловище.

НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА
Отряд Рукокрылые
Семейство Обыкновенные
летучие мыши



Ночница Наттерера



НОЧНИЦА



Прудовая ночница



Перелетный вид. Обитает у стоячих и слабопроточных водоемов. Поселяется колониями под крышами и карнизами зданий, самцы живут поодиночке в дуплах. Питается преимущественно комарами. Охотится над во,



Малая вечерница



Окраска тела от рыжевато-коричневой до тёмно-каштановой. Кормится бабочками вскоре после заката солнца и перед рассветом. Летом поселяется колониями в дуплах деревьев. К исчезновению привели санитарные рубки, при которых убираются дуплистые деревья.

Меры охраны: сохранение старовозрастных участков леса, развеска гнездовых ящичков для летучих мышей в "омоложенных" лесах.

Северный кожанок.

Гладконосая летучая мышь. Зимует в подземных помещениях старых фортификаций. Весной и осенью обнаруживает в наружных и внутренних щелях различных сооружений человека. Длина тела 5-6 см, размах крыльев 24-27 см. Радиус полета может достигать 20-30 км.



Берегите тушканчиков: они
занесены в Красную книгу!



Суслик крапчатый



- **СУСЛИК КРАПЧАТЫЙ (Citellus suslicus)** величиной с малого суслика, но окраска верха контрастно-пятнистая: на темном фоне спины четко выделяются почти белые округлые пятна. Подошвы задних ног покрыты волосами.

Орешниковая соня



- Длина тела взрослых зверьков не превышает 90 мм, длина хвоста — 70 мм, вес тела — 30 г. Окраска однотонная, желтовато-рыжая, на груди и животе большие светлые пятна. Хвост густо опушен по всей длине, на конце — слабо развитая кисточка. Глаза темные, выпуклые, хорошо выделяются на рыжем фоне. Приспособление к лазанию по деревьям и кустарникам выражается в практически одинаковой длине четырех пальцев передней конечности и перпендикулярном положении первого пальца задней конечности, который к тому же не имеет когтя.

СТЕПНАЯ ПЕСТРУШКА





Европейская норка



Обитает по берегам мелких речек и ручьев, не пересыхающих летом и не промерзающих зимой. Предпочитает лесные водоемы с обрывистыми и нависшими берегами, изобилующими пустотами и завалами. Питается преимущественно рыбой, лягушками, моллюсками, мелкими грызунами,



РЫСЬ



И многие другие...



- На сегодняшний день наша природа и наша среда обитания находится на грани истощения. Очень часто люди идут на охоту, рыбалку и не задумываются о том, какое животное сейчас, в данный момент, в данную секунду они истребят. Ведь это самое животное может быть последним в своем виде или даже роде, а может и семействе. Мы не задумываемся над тем, что убиваем несчастных животных только ради своей выгоды, своего удовольствия. И если это будет продолжаться, то исчезнут все животные, в том числе и мы. Если не мы побережем природу, то кто это сделает за нас? **Давайте будем беречь ее вместе!**

