

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»


Рыбы Красной книги Челябинской области

Учитель начальных классов

Е.С Пирогова



**В Красной книге Челябинской области
находится 5 видов рыб**





Стерлядь - отряд Осетрообразные, семейство Осетровые.

Распространение: Реки бассейнов Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского, Баренцева, Белого и Карского морей. В середине XIX в. из рек Чусовая и Урал был интродуцирован в озера близ г. Касли.



Предкавказская кумжа

- отряд Лососеобразные,
семейство Лососевые.

Распространение. Бассейны Баренцева,
Белого, Балтийского, Черного,
Каспийского и Аральского морей [1,2].

Предкавказская кумжа обитает в Каспийском море,
на нерест идет в реки его западного побережья
(кроме р. Куры) [1].

В реках Южного Урала встречается только
пресноводная форма — форель,
являющаяся реликтом ледниковых эпох.



Обыкновенный таймень - отряд Лососеобразные,
семейство Лососевые

.Распространение. От верховьев Печоры,
Камы и Вятки на западе до бассейнов Яны и Амура на
востоке.

На юге отмечен до оз. Хубсугул (Монголия). В верховье р.
Волги, по-видимому, исчез.

Встречается от Полярного до Южного Урала, обычен в
водоемах Приполярного Урала.



Европейский хариус - отряд Лесосеобразные, семейство Хариусовые. Распространение. Почти вся Европа между 42 и 70 с. ш. — от Франции до Уральских гор.



Обыкновенный подкаменщик - отряд скорпенообразные, семейство Керчаковые.
Распространение. Небольшие речки и ручьи Западной Европы и европейской части России. Восточная граница ареала проходит по западному макросклону Уральского хребта. На территории Челябинской области встречается в верховьях рек Юрюзань, Сим, Уфа, Лемез.



⦿ Источники:

⦿ <http://redbook.74216s003.edusite.ru/p32aa1.html>

