

СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ПИЩИ

**МАОУ «Экономическая
гимназия»**

6 «А» класс

Каднай Тимофей



Формы активного питания у животных



Поис

к



Подкарауливан

ие



Пасть

ба



Ловл



Собирательс

**Шимпанзе палками
достають високо
висящіє банани, а
прутиком
(предварительно
очищенным от
листьев!)
вытаскивают себе
пищу из дырок в
термитнике, либо
мед из дупла и т.д.**





Песчаные осы - аммофилы кормят своих личинок парализованными гусеницами. Парализуют укусом жала в нервные центры. Гусеница не мертва, только неподвижна и потому долго не портится. Получаются своего рода консервы.



Личинки муравьиного льва для своих жертв, мелких членистоногих и муравьев, роет ловчие ямы и прячется на дне. Когда муравей попадает в яму, хищная личинка обстреливает его песком, кидает его, подбрасывая большой головой. Муравей падает на дно ямы прямо в сабли-челюсти своего смертельного врага



**Снежные обезьяны моют
свою пищу в горячих
источниках.**

Крот обладает в высшей степени острыми чувствами. Особенно развито у него обоняние, с помощью которого он находит себе пищу и ориентируется в своих необыкновенно запутанных ходах. Пищу крота составляют в основном дождевые черви и, отчасти, слизни, личинки майских жуков (хрущей), шелконов (проволочники), многоножки, медведки, мокрицы, гусеницы вредоносной совки и другие насекомые - все, кто попадают в его кормовые ходы. Для их ловли кроты и прокладывают длинные ходы на незначительной глубине под землей. Кротовый ход для дождевых червей представляет собой ловушку с пахучей или тепловой приманкой, куда черви заползают сами привлеченные запахом кротового мускуса и более



СИНИЙ КИТ -

он добывает пищу (преимущественно планктон) посредством своеобразного цедильного аппарата – китового уса, размещающегося во рту. Зубов у современных усатых китов нет, они рассасываются еще на стадии зародыша.

