



Насекомые  
Ханты – Мансийского  
автономного округа –  
Югры, занесенные в  
**Красную Книгу ХМАО –**  
**Югры**



# Красотка блестящая

Средних размеров стрекоза с темными крыльями.

Размах крыльев 65- 75 мм, длина брюшка 34-38 мм.

Тело самцов металлически-синее, крылья у основания и у вершины бесцветные, середина крыла с широкой синей или темно-синей перевязью; у самок тело золотисто-зеленое, а крылья почти бесцветные с зелеными жилками.



# **Красотка – девушка**

**Средних размеров стрекоза с темными крыльями.**

**Размах крыльев 58- 75 мм, длина брюшка 30-31 мм.**

**Тело самцов металлически-зелено-синее или синее, крылья от основания и почти до вершины темно-синие; у самок тело бронзо-во-зеленое, а крылья светло-дымчатые, с бурыми жилками, только костальная жилка металлически-зеленая.**



# Стрекоза блестящая



Небольшая стрекоза с тонким телом, самая маленькая стрекоза России.

Размах крыльев 30-42 мм, длина тела 23-28 мм. Тело металлически-зеленое.

Крылья узкие, сетчатые, неокрашенные, в покое обычно складываются над телом.

# Стрекоза изящная

Небольшая стрекоза с тонким телом. Размах крыльев 31-45 мм, длина тела 22-29 мм. Тело пестрое, брюшко сверху черное, снизу голубое, VIII членик брюшка целиком голубой. Крылья узкие, сетчатые, неокрашенные, в покое обычно складываются над телом.





# Трахидрахус Заттерштедта



Мелкий вид (длина тела 5,0-7,0 мм). Черный, верхняя сторона тела блестящая, бронзовая, выпуклая, нижняя уплощенная. Передняя спинка слабопоперечная, сердцевидная, сужающаяся как к основанию, так и к переднему краю, наибольшая ширина у середины. На основании передней спинки, в ее задних углах, выражены небольшие складочки. Надкрылья гладкие, блестящие, со слабыми точечными бороздками. Усики и ноги темно-красноватые, по облику жуки напоминают жужелиц рода *Amara*. От жужелиц (*Carabidae*) отличается сильно развитыми задними тазиками, достигающими до краев тела и отделяющими заднюю грудь от основных стернитов брюшка.

# Жужелица Ермака



*Крупный жук (длина тела 15-20 мм). Верх с сильным металлическим блеском: передняя спинка бронзовая, надкрылья ярко-зеленые, их края более яркие с каймой от золотисто-зеленого до пурпурного цвета. На каждом надкрылье по 3 черных кля. Морфологически близок к европейскому виду *C. nitens*, от которого отличается более длинными жвалами.*



# Жужелица Дрешера

*Жук среднего размера (длина тела 15-17 мм). Верх черный, усики черные, ноги смоляно-бурые или черные, бедра красновато-бурые.*

*Переднеспинка морщинистая, сердцевидная, уплощенная, на ее основании по 1 штриховидной косой ямке. Надкрылья матовые или слабо блестящие, уплощенные, покрыты рядами вытянутых ямок.*



# Жужелица Маклея

*Среднего размера (длина тела 14-17 мм), плотно сложенный жук. Переднеспинка округлая, слабоморщинистая. Надкрылья с выраженными бугорками, не образующими правильных рядов. Верх тела блестяще-черный с фиолетовым отливом. Бока передней спинки и надкрылий с яркой металлической каймой от пурпурного до золотисто-зеленого цвета. Голова небольшая черная.*



# Жужелица Манетри

*Крупный жук (длина тела 18-23 мм). Верх бронзовый или черно-бронзовый, усики и ноги черные. Надкрылья с двумя приподнятыми киями, между которыми расположены три ряда четко выраженных округлых или слабовытянутых бугорков. Морфологически близок к широко распространенному на территории округа виду *C. granulatus* L., от которого отличается отсутствием пришовного кия на надкрыльях, более рельефной скульптурой надкрылий и более массивной передней спинкой.*

