


Лихорадка Денге




Лихорадка денге



- Лихорадка Денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки Денге развивается геморрагический синдром.
- Встречается лихорадка Денге преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Преимущественно заболевают дети и вновь прибывшие в эндемичный район лица.
- Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам, семейства *Togaviridae* рода *Flavivirus* (арбовирусы антигенной группы В).
- Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары (*Aedes aegypti*) у человека и (*Aedes albopictus*) у обезьян.

- Симптомы лихорадки Денге
- Инкубационный период составляет в среднем 3—15 дней (чаще 5—7 дней).
- Классическая лихорадка Денге (заболевает человек при первичном инфицировании) : озноб, боли в костях (чаще в позвоночнике), боли в суставах (особенно в коленных суставах), боли в мышцах, повышение температуры до 39—40°C (к концу 3-их суток температура резко снижается, а через 1—3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2—3 дня),



Геморрагическая сыпь при лихорадке Денге



- анорексия (отказ от еды из-за отсутствия аппетита). адинамия
- бессонница, покраснение и отёчность лица, покраснение глаз, покраснение горла, учащение пульса в начале заболевания, а через 2—3 дня он сильно урежается, различная зудящая сыпь (сначала сыпь появляется на туловище, затем распространяется на конечности и сохраняется 3—7 дней): петехиальная – точечные кровоизлияния, скарлатиноподобная — покраснение кожи, на фоне которого определяются пятнышки величиной с просыное зерно., уртикарная — возвышающиеся над поверхностью кожи отечные волдыри ярко-розового цвета размером от 0,5 до нескольких сантиметров, сильно зудящие.

Осложнения лихорадки Денге

- инфекционно-токсический шок
- энцефалит
- менингит
- психоз
- полиневрит
- пневмония
- паротит
- Отит

У перенесших лихорадку Денге людей иммунитет сохраняется около 2 лет, поэтому через некоторое время они могут заболеть повторно.

Для предотвращения заражения лихорадкой Денге рекомендуется

Диагностика лихорадки



Лабораторные методы исследования:

- общий анализ крови
- выявление антител (реакция связывания комплемента, реакция торможения гемагглютинации, реакция нейтрализации)

Лечение лихорадки Денге

Больных госпитализируют в стационар.

- При классической форме заболевания назначают:
 - болеутоляющие
 - витамины
 - антигистаминные
- При геморрагической форме заболевания назначают:
 - инфузионную терапию
 - введение плазмы и плазмозаменителей (в тяжелых случаях)
 - глюкокортикоиды (в тяжелых случаях)
 - кислородотерапию
 - антикоагулянты прямого действия



Профилактика Лихорадки Денге:



- На сегодняшний день лицензированных вакцин против денге нет.
- В настоящее время единственным способом контроля или предотвращения передачи вируса денге является борьба с комарами-переносчиками.