


Красная книга России.
Даурский ёж.



Автор: Учитель начальных
классов ГОУСОШ № 2038
Середенко Г.А.




Даурский ёж - млекопитающее семейства ежевых. Это ёж небольшого размера с короткими иглами, окрас которых варьирует от светло-песочного до тёмно-бурого; окрас грубого меха на брюшке — от серого до тёмно-бурого.

Распространение.

Область распространения даурского ёжа охватывает степную, лесостепную и частично южнотаёжную зоны Забайкалья (юг Бурятии и юго-восток Забайкальского края) и прилегающие территории северо-восточной Монголии и Северного Китая.



Образ жизни и питание

A close-up photograph of a hedgehog's head and upper body. The hedgehog has brown and grey spines and is looking towards the left. The background is blurred, showing a person's hand and a wooden surface.

Распространённые местообитания даурских ежей — все типы степей, сосновые боры, ерники, агроценозы, окрестности и окраины населённых пунктов. В питании преобладают жуки (жужелицы, пластинчатоусые, чёрнотелки); часто встречаются прямокрылые. Кроме того, даурский ёж поедает мелких млекопитающих (хомячки, пищухи), яйца и птенцов, змей (полоз), лягушек, монгольских жаб, ягоды (шиповник, кизильник), падаль.

Размножени е

Гон у ежей
начинается через
10—15 дней после
пробуждения, обычно
в середине мая.
Перед родами самка
роет нору или чистит
и расширяет норы
сусликов, пищух и
полёвок.



A close-up photograph of a hedgehog's face, showing its eyes and the dense, raised quills on its head. The quills are a mix of brown and grey, and are standing upright. The background is dark and out of focus.

Статус популяции

Ощутимое сокращение популяции даурских ежей произошло в начале 1960-х гг. Из антропогенных ограничивающих факторов для даурского ежа наиболее существенны: лесные и степные пожары, применение ядохимикатов, уборочные сельхозработы и беспривязное содержание собак. Менее значимы: гибель ежей на дорогах и под копытами крупного рогатого скота, отлов и содержание в неволе.