

Красная книга Кемерововской области

Выполнила: **Ивановна**


Хорошилова Екатерина

Ивановна, учитель

начальных классов

МКОУ «Кураковская

ООШ»



Листаем страницы Красной книги


Красная книга – Красная!
Значит природа в опасности!
Значит, нельзя терять даже мига.

Всё живое хранить зовёт,
Пусть зовёт не напрасно
Красная книга.
И тревога за жизнь неустанна,
Чтоб не сгинуть в
Космической мгле!

Исчерпаемы все океаны,
Исчерпаемо всё на Земле.
Мы леса и поля обижаем
Стонут реки от горьких обид
И себя мы прощаем,
Но грядущее нас не простит.



Красная книга




- информирует

- призывает
изучать

- предупреждает

- советует

Красная книга



Выдра

На территории области сокращающийся в численности вид.

Внешние признаки

Туловище длинное и относительно тонкое, ноги короткие. Хвост длинный, составляет около половины длины тела. Голова у выдры относительно небольшая, уши короткие, округлые, слабо выступающие из меха. Окраска тела блестящая темно-бурая или темно-коричневая. Длина тела — 55—95 см, длина хвоста — 26-55 см. В Кемеровской области в прошлом выдра заселяла ее пригодные для ее жизни водоемы. В настоящее время она сохранилась преимущественно в реках Кузнецкого Алатау и Горной Шории.



Сибирская кабарга



Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Обитает на западной границе ареала. По внешнему облику кабарга резко отличается от других оленей. Ее задние ноги значительно длиннее передних, поэтому кабарга выглядит как будто «сгорбившись».

У самцов в верхней челюсти имеются тонкие длинные клыки, а на брюшной стороне — особые железы, с помощью которых они метят территорию. Окраска тела темно-

коричневая с рыжеватыми пятнами, бока светлые, а по горлу и груди тянется белая полоса. По размерам это самые мелкие из парнокопытных. В Кемеровской области обитает по горам Кузнецкого Алатау, в горах по рекам Кия, Урюп, Нижняя Терсь.

Сибирский лесной северный олень



Встречается на юге области и в верховьях Томи. Длина тела до 200 см, высота в холке — до 110 см.

Рога имеют самцы и самки, но у самок они

обычно меньше и тоньше. В Кузнецком Алатау у самок северных олене наблюдается высокий процент комолости. Рога ветвистые, дугообразно изогнутые, концами направлены вперед. Копыта широко расставлены, кожа между ними покрыта шерстью. Окраска тела зимой светло-сероватая, летом, после линьки, становится буроватой. Современное распространение в Кемеровской области ограничено вершинами Кузнецкого Алатау и Горной Шории.

Розовый пеликан



Очень редкий, залетный вид на территории Кузбасса. Очень крупная птица. Оперение взрослой птицы белое с розовым оттенком. Голые участки кожи вокруг глаз желтые. На голове имеется хохол из удлиненных перьев. Впереди оперение головы острым клином находит на голый лоб. Молодые птицы имеют темно-бурый пух и такое же темное оперение. Все четыре пальца соединены кожистой перепонкой.

Гнездится колониями на мелководных водоемах с заросшими берегами, на озерах и в дельтах рек.


Серая цапля



Самая крупная цапля в фауне России. Окраска светлая. Спина серая, брюшная сторона белая. Клюв длинный, желтовато-бурого цвета. Серые цапли гнездятся колониями В отличие от аистов и журавлей, в полете шею не вытягивает, а складывает на спину в виде буквы «S». Питаются цапли насекомыми, мелкой рыбой, лягушками. В Кемеровской области Встречается в Новокузнецком и Тисульском районах.

Краснозобая казарка

26



Гусь небольших размеров.

Окраска из сочетания черного, белого и красного. Шея, зоб и грудь кирпично-красные, такие же пятна по бокам головы, отделенные белыми полосами. Верхняя часть туловища от лба до хвоста черная. Бока туловища и подхвостье белые.

Голос краснозобой казарки напоминает гусиный гогот, но более резкий и короткий, иногда птица издает шипение. Во время перелетов казарки держатся стаями. На земле очень подвижны. В Кемеровской области краснозобая казарка селится в долине р. Кия в Чебулинском районе.

Серый журавль



Размеры крупные, вес до 7 кг. Окраска серая, только перво-степенные маховые черные. Задняя часть головы, нижняя сторона и бока шеи буровато-черные. От глаз по бокам головы и верхней стороне шеи — белые полосы, которые к основанию шеи переходят в серый цвет. В Кемеровской области распространен спорадично В настоящее время гнездится на небольших, отдаленных от селений озерах, расположенных к востоку. Осенью перед отлетом собираются в стаи до 200 особей.



**Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеет защититься.**



**Если будут уничтожены они,
На планета мы останемся одни.**

