

# ПОЛЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Презентация учителя начальных классов : Капрановой Ларисы  
Геннадиевны.

# ПОЛЕ

Поле – это большой участок земли с травянистым покровом без деревьев и кустарников. Поле – это тоже природное сообщество, только искусственное (созданное человеком)



# ПОЛЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ



# КОЛОРАДСКИЙ ЖУК

Колорадский жук – страшный враг картофельных полей. Своё народное название жук получил в 1859 году после того, как опустошил картофельные поля в американском штате Колорадо, но настоящей его родиной является Сонорская зоогеографическая подобласть на северо-востоке Мексики



# КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА

Капустная белянка, тля – вредят овощным культурам. Активный мигрант. Лесные опушки, поляны, луга, обочины дорог, сады, парки, лесополосы вдоль железных дорог, часто встречается непосредственно в населенных пунктах, где имеются возделываемые крестоцветные. урам.



# ЖУК-КУЗЬКА

Жуки предпочитают светлое время суток, наиболее активны в солнечную погоду. Появляясь на растениях утром, ночью уползают в укрытие — под ком земли или трещину в почве. Распространён в степной и лесостепной зонах Европейской части России, в Европе, Малой Азии, Иране. Кузька сильно вредит посевам в Нижнем и Среднем Поволжье, степных районах Украины, Северного Кавказа, Закавказья.



# ХЛЕБНАЯ ЖУЖЕЛИЦА

Чёрный, с тёмно-бурыми сяжками и ногами, тело толстое, сильно выпуклое, элитры точечно-бороздчатые; длина 20—25 мм. Широко распространен в средней и южной Европе, в западной и южной России; водится на полях, днем держится под камнями и, в противоположность большинству жужелиц, по преимуществу растительноядный.

Жук по ночам выедает зерна хлебов (ржи, ячменя, пшеницы)



## ШВЕДСКАЯ МУХА

За год шведские мухи успевают дать до 5 поколений (на юге) или 2—3 (в северных регионах). Откладка яиц происходит на молодые растения, у которых не более 2—3 листьев, или в колоски.

